

Kalendarz szczepień (szczepienia standardowe) dla niemowląt, dzieci, nastolatków i dorosłych¹

Język polski



Szczepienie	Wiek w tygodniach			miesiącach							latami										
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	od 18	od 60			
	U4				U5			U6				U7			U7a/U8	U9	U10	U11/U1	J2		
Rotawirus	G1 ^a		G2	(G3)																	
Tężec ^b		G1		G2		G3 ^d						A1		A2						A ⁱ	
Błonica ^b		G1		G2		G3 ^d						A1		A2						A ⁱ	
Krzusiec ^b		G1		G2		G3 ^d						A1		A2						A3 ⁱ	
Hib ^b – H. influenzae typu b		G1		G2		G3 ^d															
Polio ^b		G1		G2		G3 ^d								A1							
Zapalenie wątroby typu B ^b		G1		G2		G3 ^d															
Pneumokok ^b		G1		G2		G3 ^d															S
NOWY Meningokoki grupy B ^c		G1		G2			G3 ^d														
Meningokoki grupy C							G1														
Morbila						G1			G2												S ^g
Zauški, rubeola						G1			G2												
Varičela						G1			G2												
HPV-a – humanih papiloma virusa														G1 ⁱ G2 ⁱ							
Herpesa zoster																					G1 ⁱ G2 ⁱ
Influenca																					S (godišnje) ^h
NOWY COVID-19																					G1 ⁱ , G2 ⁱ , G3 ⁱ S (godišnje) ^h

■ preporučeno vreme vakcinacije

■ Period u kome je moguća naknadna vakcinacija za osnovnu ili primarnu imunizaciju svih još nevakcinisanih, odnosno za upotpunjavanje nepotpune serije vakcinacija

Legenda

- G osnovna imunizacija (postize se u najviše 3 delimične vakcinacije G1–G3)
- A revakcinacija
- S standardna vakcinacija

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

- a Prva doza vakcine već sa navršenih 6 nedelja, u zavisnosti od upotrebljene vakcine, 2 odnosno 3 doze vakcine u razmaku od najmanje 4 nedelje.
- b Prevremeno rođene bebe: dodatna doza vakcine sa 3 meseca starosti, tj. ukupno 4 doze vakcine; niemowlęta (w tym wcześniaki) są szczepione PCV13 lub PCV15
- c Według informacji technicznych seria szczepień składa się z 3 dawek szczepionki od 2. do 23. miesiąca życia i 2 dawek szczepionki od 24. miesiąca życia.
- d Minimalni razmak u odnosu na prethodnu dozu: 6 meseci.
- e Dve doze vakcine u razmaku od najmanje 5 meseci, kod naknadne vakcinacije počevši u uzrastu > 15 godina ili ako je razmak između vakcinacija < 5 meseci, potrebno je između 1. i 2. doze primiti i 3. dozu.
- f Td-revakcinacija na svakih 10 godina. Sledeća vakcinacija protiv Td jednokratno kao Tdap odn. kod odgovarajuće indikacije u vidu kombinovane vakcinacije Tdap-IPV.

- g Jednokratna vakcinacija MMR vakcinom za sve rođene posle 1970. i > 18 godina, nejasnog statusa vakcinisanosti, za nevakcinisane ili vakcinisane samo u delinjstvu.
- h Szczepienie do momentu osiagniecia liczby ≥ 3 kontaktów z antygenem SARS-CoV-2 wymaganých do uzyskania odporności podstawowej (w tym co najmniej 1 szczepienie). Minimalny odstęp pomiędzy szczepieniami pomiędzy G1 i G2 ≥ 4, najlepiej 12 tygodni oraz pomiędzy G2 i G3 ≥ 6 miesięcy
- i Szczepienie PCV20
- j Dvokratna vakcinacija adjuvantom umrtvljenom vakcinom protiv herpesa zostera, u razmaku od 2 do maksimalno 6 meseci.
- k Coroczne szczepienie jesienią
- * Vakcinacije mogu biti raspoređene u više termina. MMR i V mogu da se daju u istom terminu ili u razmaku od 4 nedelje.