

Kalendar vakcinacije (standardnim vakcinama) za odojčad, decu, omladinu i odrasle¹

srpski



uzrast	u nedeljama			u mesecima							u godinama							
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	od 18	od 60
Vakcinacija protiv	U4			U5	U6					U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
rotavirusa	G1 ^a		G2	(G3)														
tetanus ^b (zlog grča)	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A ^e			
difterije ^b	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A ^e			
pertusisa ^b (velikog kašlja)	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A3 ^e			
Hib-a ^b (H. influenzae tipa b)	G1		G2		G3 ^c													
poliomijelitisa ^b (decije paralize)	G1		G2		G3 ^c								A1					
hepatitisa B ^b	G1		G2		G3 ^c													
pneumokokne bolesti ^b	G1		G2		G3 ^c										S ^g			
meningokokne bolesti tipa C							G1											
morbila							G1		G2							S ⁱ		
zauški, rubeola							G1		G2									
varičela (ovčijih boginja)							G1		G2									
HPV-a (humanih papiloma virusa)														G1 ^d G2 ^d				
herpesa zoster																G1 ^h G ^h		
influenca (gripa)																S (godišnje)		

● preporučeno vreme vakcinacije ■ Period u kome je moguća naknadna vakcinacija za osnovnu ili primarnu imunizaciju svih još nevakcinisanih, odnosno za upotpunjavanje nepotpune serije vakcinacija

Legenda

G osnovna imunizacija (postize se u najviše 3 delimične vakcinacije G1–G3)

A revakcinacija

S standardna vakcinacija

a Prva doza vakcine već sa navršениh 6 nedelja, u zavisnosti od upotrebljene vakcine, 2 odnosno 3 doze vakcine u razmaku od najmanje 4 nedelje.

b Prevrtemeno rođene bebe: dodatna doza vakcine sa 3 meseca starosti, tj. ukupno 4 doze vakcine.

c Minimalni razmak u odnosu na prethodnu dozu: 6 meseci.

d Dve doze vakcine u razmaku od najmanje 5 meseci, kod naknadne vakcinacije počevši u uzrastu > 14 godina ili ako je razmak između vakcinacija < 5 meseci, potrebno je između 1. i 2. doze primiti i 3. dozu.

e Td-revakcinacija na svakih 10 godina. Sledeća vakcinacija protiv Td jednokratno kao Tdap odn. kod odgovarajuće indikacije u vidu kombinovane vakcinacije Tdap-IPV.

f Jednokratna vakcinacija MMR vakcinom za sve rođene posle 1970. i ≥ 18 godina, nejasnog statusa vakcinisanosti, za nevakcinisane ili vakcinisane samo u detinjstvu.

g Vakcinacija Z3-valentnom polisaharidnom vakcinom.

h Dvokratna vakcinacija adjuvantnom umrtvljenom vakcinom protiv herpesa zoster, u razmaku od 2 do maksimalno 6 meseci.

* Vakcinacije mogu biti raspoređene u više termina. MMR i V mogu da se daju u istom terminu ili u razmaku od 4 nedelje.