

## Имунизационен календар за деца, юноши и възрастни в провинция Саксония. (Състояние 01.01.2024 г.)

Ваксина <sup>#</sup>	Постнатален	6 седмици	2 месеца	3 месеца	4 месеца	6 месеца	11 месеца	12 месеца (1 година)	14 месеца	23 месеца	4 години	5 години	9 години	10 години	25 години	≥ 50 години	≥ 60 години	на всеки 10г	
<b>Хепатит В и Хепатит А (HBV/HAV)</b>		HBV 1/HBV 2 (интервал > 4 седмици)						HBV 3/4 (интервал > 4 седмици) HAV 1 ► HAV 2 (интервал 6–12 месеца) или HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (интервал > 4 седмици) ► HAV/HBV 3 (интервал 6–12 месеца)											
<b>Дифтерия, тетанус, коклюш*</b>			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3			DTPa 4			DTPa 5			Tdap				Tdap	
<b>Хемофилус инфлуенце тип b*</b>			Hib 1	*	Hib 2			Hib 3											
<b>Полиомиелит (IPV)* (тривалентен)</b>			IPV 1	*	IPV 2			IPV 3					IPV 4					IPV	
<b>Морбили, заушка, рубеола (MMR)</b>							MMR 1		MMR 2			MMR 3 <sup>‡</sup>							
<b>Варицела (VZV)</b>							VZV 1		VZV 2										
<b>Менингококи В</b>			Менингококи (група В)																
<b>Менингококи ACWY/C</b>			Менингококи (групи ACWY/C)																
<b>Инфлуенца**</b>																			Инфлуенца година
<b>COVID-19**</b>																			COVID-19
<b>Пневмококи***</b>			PCV 1 ► PCV 2 (интервал > 2 месеца), PCV 3 (интервал > 7 месеца)															Пневмококи	
<b>Ротавируси</b>			Ротавируси																
<b>Човешки папилома вируси (HPV)***</b>													≤ 14 г HPV1 ► HPV 2 ≥ 15 г HPV1 ► HPV2 ► HPV3						
<b>Херпес зостер***</b>																RZV 1 ► RZV 2 (интервал >6 месеца)			

<sup>#</sup> Задължително е да се спазва кратката характеристика на продукта за съответните ваксини и следващите таблици с информация за приложение и интервали на ваксиниране! <sup>‡</sup> Всички чувствителни лица (вижте таблиците по-долу). \* За антигенни комбинации, съдържащи компонент на коклюш, са необходими три инжекции в ранна детска възраст; При доносени бебета втората ваксинация, планирана на 3-месечна възраст, може да се пропусне, когато се използват 6- или 5-кратни ваксини (известен като график 2 + 1). \*\* Годишен сезонен бустер с ваксина, адаптирана към циркулиращите вирусни варианти (COVID-19) или шам (грип). \*\*\* Като предпочитание се препоръчват следните ваксини: пневмококова (от 18-годишна възраст): 20-valent conjugate vaccine (PCV20), HPV: 9-валентна ваксина; херпес зостер: рекомбинантна ваксина с адювант (RZV).