

Календарь прививок для детей, молодежи и взрослых в Свободном государстве Саксония. (Статус 01.01.2024)

Вакцина [‡]	После-родовой	6 недель	2 месяца	3 месяца	4 месяца	6 месяцев	11 месяцев	12 месяцев (1 год)	14 месяцев	23 месяцев	4 года	5 года	9 года	10 года	25 года	≥ 50 года	≥ 60 года	каждые 10 лет		
Гепатит В и Гепатит А (HBV/HAВ)		HBV 1/HBV 2 (интервал > 4 недель)							HBV 3/4 или HAВ 1 ► HAВ 2 (интервал 6–12 месяцев) или HAВ/HBV 1 ► HAВ/HBV 2 (интервал > 4 недель) ► HAВ/HBV 3 (интервал 6–12 месяцев)											
Дифтерия, столбняк, коклюш *			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3				DTPa 4			DTPa 5		Tdap					Tdap	
Гемофильная инфекция тип b *			Hib 1	*	Hib 2				Hib 3											
Полиомиелит (ИПВ) * (трехвалентный)			IPV 1	*	IPV 2				IPV 3					IPV 4					IPV	
Корь, свинка, краснуха (MMR)								MMR 1	MMR 2				MMR 3 [‡]							
Ветряная оспа (VZV)								VZV 1	VZV 2											
Менингококковый В			Менингококковый (группа В)																	
Менингококковый ACWY/C			Менингококковый (группы ACWY/C)																	
Грипп **											Грипп ежегодно									
COVID-19 **																			COVID-19	
Пневмококки ***			PCV 1 ► PCV 2 (интервал > 2 месяцев), PCV 3 (интервал > 7 месяцев)															Пневмококки		
Ротавирус			Ротавирус																	
Папилломавирусы человека (ВПЧ) ***													≤ 14 г ВПЧ 1 ► ВПЧ 2 ≥ 15 г ГПВ1 ► ГПВ2 ► ГПВ3							
Опоясывающий герпес ***																RZV 1 ► RZV 2 (интервал >6 месяцев)				

‡ Обязательно обратите внимание на краткие характеристики продуктов для соответствующих вакцин и следующие таблицы с информацией о применении и интервалах вакцинации! **‡** Все восприимчивые лица (см. таблицы ниже) * Для комбинаций антигенов, содержащих коклюшный компонент, в младенчестве требуется три инъекции; У доношенных детей вторую вакцинацию, запланированную в 3-месячном возрасте, можно не проводить при использовании 6- или 5-кратной вакцины (мечтаю схему 2+1). ** Ежегодная сезонная ревакцинация вакциной, адаптированной к вариантам циркулирующего вируса (COVID-19) или штамму (грипп). *** Предпочтительны следующие вакцины: Пневмококки (с 18 лет): 20-валентная конъюгированная вакцина (PCV20), ВПЧ: 9-валентная вакцина; опоясывающий герпес: рекомбинантная, адьювантная вакцина (RZV)