

# Aşı Takvimi 2026

(Aşılar ve monoklonal antikorlar [mAk] ile yapılan standart bağışıklama)



A – Bebekler ve 5 yaşından küçük çocuklar (0 – 59 ay)

Aşı/ Bağışıklama	Yaş (hafta)			Yaş (ay)										
	0	4	6	2	3	4	5–6	7–10	11*	12	13–14	15	16–23	24–59
	U2	U3	U4			U5		U6				U7	U7a/U8	
Solunum sinsițial virüsleri	Doğum ayına bağılı olarak mAk (tek doz) <sup>a</sup>													
Rotavirüs		G1 <sup>b</sup>		G2	(G3)									
Tetanoz <sup>c</sup>				G1		G2	G3 <sup>f</sup>							
Difteri <sup>c</sup>				G1		G2	G3 <sup>f</sup>							
Boğmaca <sup>c</sup>				G1		G2	G3 <sup>f</sup>							
Hib <sup>b</sup> <i>H. influenzae</i> Tip b				G1		G2	G3 <sup>f</sup>							
Çocuk felci <sup>c</sup>				G1		G2	G3 <sup>f</sup>							
Hepatit B <sup>c</sup>				G1		G2	G3 <sup>f</sup>							
Pnömonokok <sup>c,d</sup>				G1		G2	G3 <sup>f</sup>							
Meningokok B <sup>e</sup>				G1		G2				G3 <sup>f</sup>				
Kızamık, kabakulak, kızamıkçık									G1			G2		
Suçiçeğı									G1			G2		
Randevu/Tarih														

■ Önerilen aşı zamanı

■ mAk uygulaması için önerilen zaman aralığı

■ mAk uygulaması ve temel ve/veya ilk aşılama için telafi aşısının zaman aralığı

G Temel aşı  
(G1–G3)

A Pekiştirme aşısı

S Standart aşı

mAk monoklonal antikorlar

a Nisan-Eylül arasında doğan bebeklere ilk RSV mevsimi başlamadan önce sonbaharda Nirsevimab verilmelidir; gebelik süresi ne olursa olsun, RSV mevsimi sırasında (genellikle Ekim ile Mart arasında), yenidoğanlara ise doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak doğum merkezinden taburcu olurken veya U2 muayenesi (doğumdan sonraki 3-10 gün) sırasında Nirsevimab verilmelidir.

b İlk aşı dozu 6 haftalıktan itibaren verilebilir ve kullanılan aşıya bağılı olarak en az 4 haftalık aralıklarla 2 veya 3 doz daha yapılır

c Prematüre bebekler: 3 aylıktan ek bir aşı dozu, yani toplamda 4 aşı dozu

d Bebekler (prematüre dahil) PCV13 veya PCV15 ile aşılanır

e Ürün bilgilerine göre aşı serisi 2-23 aylık çocuklarda 3 doz, 24 ay ve üzeri çocuklarda 2 doz aşından oluşur

f Bir önceki aşı dozundan sonra geçmesi gereken minimum süre: 6 ay

Kaynak: Robert Koch Enstitüsü Aşılama Daimi Komitesi (STIKO) önerilerinden uyarlanmıştır. Epi-Bull 4/2026

impfen.sanofi.de

sanofi

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,  
Lützowstraße 107, 10785 Berlin

# Çocuğunuzun Aşı Takvimi

(STIKO'ya göre 5 yaş üzeri çocuklar, ergenler ve erişkinler için standart aşılar)



Aşı	Yaş (yıl)									
	5-6	7-8	9-11	12-14	15-16	17	18-24	25-59	60-74	75 ve üzeri
	U9	U10	U11	J1		J2				
Tetanoz	A1			A2				A <sup>b</sup>		
Difteri	A1			A2				A <sup>b</sup>		
Boğmaca	A1			A2			A3 <sup>b</sup>			
Çocuk felci				A1						
Hepatit B										
HPV – İnsan papilloma virüsü			G <sup>9</sup> ve G2 <sup>9</sup>							
Meningokok ACWY				G1**						
Kızamık							S <sup>i</sup>			
Kabakulak, kızamıkçık										
Suçiçeği										
Pnömonok									S <sup>k</sup>	
Herpes zoster									G1 <sup>i</sup> /G2 <sup>i</sup>	
Grip									S (her yıl) <sup>m</sup>	
COVID-19							Gx <sup>i</sup>		S (her yıl) <sup>m</sup>	
Solunum sinsiyal virüsleri										S <sup>n</sup>
Randevu/Tarih										

- g** En az 5 ay arayla iki doz aşı; 15 yaş ve üzeri kişilerde telafi aşısı yapılacaksa veya 1. ve 2. aşı dozları arasında 5 aydan az bir süre geçmişse, bir 3. doz aşısı gereklidir
- h** Td pekiştirme aşısı her 10 yılda bir yapılır. Bir sonraki Td aşısı, 1 seferlik Tdap aşısı olarak ve/veya gerekliyse Tdap-IPV kombine aşısı olarak yapılır
- i** 1970'ten sonra doğmuş, aşı durumu belirsiz, hiç aşı olmamış veya çocukluk döneminde sadece bir kez aşı olmuş tüm 18 yaş ve üzeri kişilere bir doz MMR aşısı
- j** Temel bağışıklık için gereken  $\geq 3$  SARS-CoV-2 antijen maruziyet sayısına (en az 11 aşı) ulaşınca kadar aşılanmalıdır. Minimum aşı aralığı, G1-G2 arasında  $\geq 4$  hafta (tercihen 12 hafta) ve G2-G3 arasında  $\geq 6$  ay olmalıdır
- k** PCV20 ile aşılanma

- l** En az 2 ve en fazla 6 ay arayla uygulanan, 2 doz adjuvanlı inaktif herpes zoster aşısı
- m** Her yıl sonbaharda aşılanma
- n** RSV mevsimi başlamadan önce, yaz sonu/sonbaharda protein bazu bir RSV aşısı ile 1 doz aşı
- \*** Aşılar birkaç randevuya yayılabilir. MMR ve V aynı randevuda veya 4 hafta arayla verilebilir
- \*\*** A, C, W ve Y serogrup meningokoklarına karşı dörtlü konjugat aşılardan oluşan bir doz, aşı durumuna bakılmaksızın 12-14 yaş arasındaki tüm çocuk ve gençlere uygulanır; 25 yaşına kadar telafi aşısı yapılabilir. Robert Koch-Institut (RKI)Epid Bull 2025; 44:1-36