

Pegatinas para su primer álbum de fotos



MAT-DE-2004554-2.0-03/2023

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Lützowstr 107 | 10785 Berlin
Teléfono 030 2575-2000 | www.impfen.sanofi.de

sanofi

Folleto informativo

Vacunación durante
el embarazo



Consulte a su médico si desea más
información.




sanofi

Tos ferina:

Proteja a su bebé desde el primer día

Protección durante el embarazo gracias a la vacuna

¿Qué es la *tos ferina*?



La tos ferina (o tos convulsa) es una enfermedad muy contagiosa que provoca fuertes ataques de tos que dificultan la respiración. Es especialmente grave en los primeros meses de vida, ya que a esta edad los bebés son demasiado pequeños para vacunarlos y están, por tanto, muy desprotegidos.

¿Cómo se propaga la *tos ferina*?



La tos ferina se transmite al toser, estornudar o por contacto cercano. Muchos casos de tos ferina en niños menores de 6 meses son causados por contagios entre familiares cercanos.

Una enfermedad con consecuencias graves



Un niño con tos ferina puede sufrir una falta de aire aguda, ponerse azul o vomitar tras un ataque de tos prolongado. En los casos más graves, puede provocar neumonía, lesiones cerebrales permanentes e incluso la muerte.

Alrededor de la mitad de los lactantes que contraen la tos ferina tienen que ser hospitalizados por complicaciones relacionadas a la enfermedad.

Un problema mundial



A pesar de la disponibilidad de vacunas, se siguen produciendo brotes de tos ferina, ya que, por ejemplo, en Alemania el ~50% de los adultos no están vacunados contra la tos ferina o no han recibido todas las vacunas necesarias. A su vez, los casos reportados van en aumento en todo el mundo. Fuera de Alemania se han notificado un número creciente de casos y muertes de lactantes en los últimos años. Países como los Estados Unidos, Gran Bretaña o España, recomiendan vacunarse contra la tos ferina durante el embarazo. La Ständige Impfkommission (Comisión Permanente de Vacunación, STIKO) también hizo esta recomendación en Alemania.

¿Cómo puedo proteger a mi bebé de la *tos ferina*?

Puede proteger a su bebé de la tos ferina en las primeras semanas tras el nacimiento. Los expertos de la STIKO recomiendan que se vacune contra la tos ferina durante cada embarazo, idealmente en el 3er trimestre, o en el



2nd trimestre si existe un mayor riesgo de nacimiento prematuro. Al estar vacunada, puede transmitir anticuerpos a su bebé nonato. Estos anticuerpos pueden proteger a su hijo en las primeras semanas de vida, mientras es vulnerable, hasta que pueda ser vacunado. Debe vacunarse en cada embarazo aunque ya se haya vacunado en el pasado o haya tenido tos ferina.

Es importante que no solo el padre y los hermanos estén protegidos contra la tos ferina, sino también todos los familiares cercanos y otras personas que estén con el bebé. Haga un repaso rápido de sus vacunas con su médico de cabecera para asegurarse de estar al día.

