

Calendário de vacinação para crianças, adolescentes e adultos no Estado Livre da Saxónia. (situação 01.01.2024)

Vacina [#]	Pós-natal	6 semanas	2 meses	3 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses (1 ano)	14 meses	23 meses	4 anos	5 anos	9 anos	10 anos	25 anos	≥ 50 anos	≥ 60 anos	a cada 10 anos		
Hepatite B e Hepatite A (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 (intervalo > 4 semanas)						HBV 3/4 ou HAV 1 ► HAV 2 (intervalo 6–12 meses) ou HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (intervalo > 4 semanas) ► HAV/HBV 3 (intervalo 6–12 meses)												
Difteria, tétano, pertussis *			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3			DTPa 4			DTPa 5			Tdap					Tdap	
Haemophilus influenzae tipo b *			Hib 1	*	Hib 2			Hib 3												
Poliomielite (IPV) * (trivalente)			IPV 1	*	IPV 2			IPV 3						IPV 4					IPV	
Sarampo, papeira, rubéola (MMR)							MMR 1	MMR 2				MMR 3 [‡]								
Varicela (VZV)							VZV 1	VZV 2												
Meningocócica B			Meningocócica (grupo B)																	
Meningocócica ACWY/C			Meningocócica (grupos ACWY/C)																	
Influenza **								Influenza anualmente												
COVID-19 **																			COVID-19	
Pneumococo ***			PCV 1 ► PCV 2 (intervalo > 2 meses), PCV 3 (intervalo > 7 meses)																	Pneumococo
Rotavírus		Rotavírus																		
Papilomavírus humano (HPV) ***													≤ 14 anos HPV1 ► HPV 2 ≥ 15 anos HPV1 ► HPV2 ► HPV3							
Herpes zóster ***																			RZV 1 ► RZV 2 (intervalo >6 meses)	

[#] É imprescindível observar o resumo das características dos produtos das respectivas vacinas e as tabelas a seguir com informações sobre aplicação e intervalos de vacinação! ^{*} Todas as pessoas suscetíveis (ver tabelas abaixo) ^{*} Para combinações de antígenos contendo um componente de coqueluche, são necessárias três injeções na infância; Em bebês nascidos a termo, a segunda vacinação planejada aos 3 meses de idade pode ser omitida quando se utilizam vacinas de 6 ou 5 vezes (o chamado esquema 2 + 1). ^{**} Reforço sazonal anual com uma vacina adaptada às variantes do vírus em circulação (COVID-19) ou uma vacina adaptada a uma estirpe (gripe) ^{***} As seguintes vacinas são recomendadas como preferência: Pneumococo (a partir de 18 anos): vacina conjugada 20-valente (PCV20), HPV: vacina 9-valente; herpes zoster: vacina recombinante com adjuvante (RZV)