

Календар вакцинації (стандартні щеплення) для немовлят, дітей, підлітків та дорослих¹

Українська



Щеплення	Вік у тижнях					місяцях					роках												
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	від 18 років	від 60 років					
Щеплення		U4				U5			U6			U7		U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2				
Ротавірус	G1 ^a		G2	(G3)																			
Правець ^b		G1		G2		G3 ^c							A1		A2					A ^d			
Дифтерія ^b		G1		G2		G3 ^c							A1		A2					A ^d			
Кашлюк ^b		G1		G2		G3 ^c							A1		A2					A3 ^e			
ХІВ ^b Гемофільна інфекція типу b		G1		G2		G3 ^c																	
Поліомієліт ^b		G1		G2		G3 ^c								A1									
Гепатит В ^b		G1		G2		G3 ^c																	
Пневмококи ^b		G1		G2		G3 ^c															S		
Менінгокок групи В ^a		G1		G2					G3 ^c														
Менінгокок групи С									G1														
Кір						G1				G2											S ^e		
Епідемічний паротит, краснуха						G1				G2													
Вітряна віспа						G1				G2													
ВПЛ – Віруси папіломи людини															G1 ^f	G2 ^f							
Оперізуючий герпес																					G1 ^g	G2 ^g	
Грип																						S (щорічно) ^h	
COVID-19																						G1 ⁱ , G2 ⁱ , G3 ⁱ	S (щорічно) ^h

a Рекомендований час щеплення

b Вакцинація при порушенні календаря (надолуження пропущеної первинної вакцинації чи першого щеплення або завершення неповної серії вакцинації)

Пояснення

G Первинна імунізація
(може включати до 3 доз щеплень G1–G3)

A Ревакцинація

S Планова вакцинація

¹ RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

a Перша доза вакцини вводиться з 6-тижневого віку, залежно від типу вакцини щеплення може проводитися 2 або 3 дозами з інтервалом не менше ніж 4 тижні

b Недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3 місяців, тобто всього 4 дози вакцини; Немовлята (також недоношених) вакцинують PCV13 (кон'югована пневмококова вакцина) або PCV15

в Відповідно до інформації про препарат, курс вакцинації складається з 3 доз вакцини у віці від 2 до 23 місяців та 2 доз вакцини у віці з 24 місяців.

г Мінімальний інтервал від попередньої дози щеплення: 6 місяців

д Дві дози вакцини з інтервалом не менш ніж 5 місяців, у разі щеплення з порушенням календаря, починаючи від віку >14 років або при інтервалі вакцинації <5 місяців, між 1-ю і 2-ю дозою має бути введена 3-я доза.

e Ревакцинація проти правця та дифтерії кожні 10 років. Наступна вакцинація проти правця та дифтерії один раз у вигляді вакцини проти правця, дифтерії та кашлюка або за показаннями у вигляді комбінованої вакцинації проти правця, дифтерії та кашлюка-ІПВ

e Одна доза вакцини ККП для всіх осіб віком ≥ 18 років, народжених після 1970 року, з невідомим статусом вакцинації, без щеплення або лише з одним щепленням у дитинстві

e Вакцинація, поки кількість контактів з антигеном SARS-CoV-2, необхідним для базового імунітету, не стане ≥ 3

(включаючи принаймні 1 щеплення). Мінімальний інтервал вакцинації між G1 і G2 від ≥ 4 до переважно 12 тижнів, а між G2 і G3 ≥ 6 місяців

ж Вакцинація PCV20

з Дві дози ад'ювантної інактивованої вакцини проти оперізуючого герпесу з інтервалом щонайменше від 2 до максимум 6 місяців

и Щорічна вакцинація в одній період

***** Щеплення може бути розділено на декілька дат. Щеплення проти кору, епідемічного паротиту й краснухи та щеплення проти вітряної віспи може проводитися в один день або з інтервалом в 4 тижні

MAT-DE-2400751-V1 0-02/2024