الجداول الزمنية للتطعيمات)القياسية(المعطاة للرضع والأطفال الصغار واليافعين والبالغين[1]

العربية

لعمر بعدد	الأسابيع			الشهور										السنوات					
	٦	٢	٣	٤	٥–١٠	*١١	١٢	١٣–١٤	١٥	١٦–٢٣	٢–٤	٥–٦	٧–٨	٩–١٤	١٥–١٦	١٧	بدءًا من ١٨	بدءًا من ٦٠
تلقيح		U٤			U٥	U٦				U٧	U٧	U٨a/U٧	U٩	U١٠	U١١/J١		J٢	
الفيروسات العجلية		G١[a]	G٢	(G٣)														
التيتانوس[b]		G١		G٢		G٣[c]						A١			A٢		[c]A	
الدفتريا[b]		G١		G٢		G٣[c]						A١			A٢		[c]A	
الشاهوة[b]		G١		G٢		G٣[c]						A١			A٢		[c]A٣	
المستدمية النزلية[b] – النزلة الترقية من النوع ب		G١		G٢		G٣[c]												
التهاب سنجابية النخاع[b]		G١		G٢		G٣[c]									A١			
التهاب الكبد ب[b]		G١		G٢		G٣[c]												
المكورات الرئوية[b]		G١		G٢		G٣[c]												[b]S
المكورات السحائية ب[e]		G١		G٢			[c]G٣											
المكورات السحائية سي							G١											
الحصبة						G١			G٢								[b]S	
النكاف، والحصبة الألمانية						G١			G٢									
جدري الماء						G١			G٢									
HPV – فيروس الورم الحليمي البشري													[g]G٢	[g]G١				
الهربس النُطاقي																	[b]G١	[b]G٢
الإنفلونزا																		S (سنويًا)[h]
COVID-١٩[i]													[c]G١,[c]G٢,[c]G٣					S (سنويًا)[h]

موعد التطعيم الموصى به

الفترة الزمنية لاستدراك التطعيم للتحصين الأساسيّ أو الأول لكل من لم يتم تطعيمهم أو لإكمال سلسلة تطعيم غير مكتملة

الشروحات

حرف G تحصين أساسي(فيما يصل إلى ٣ تطعيمات جزئية (G١–G٣

حرف A تطعيم مُجدد

حرف S تطعيم قياسي

أ جرعة التطعيم الأولى بدءًا بسن ٦ أسابيع، حسب اللقاح المُستخدَم ٢ إلى ٣ جرعات من اللقاح على مسافةٍ زمنية متباعدة أدناها ٤ أسابيع.

ب الأطفال الخدج: جرعة إضافية من اللقاح في عمر ٣ أشهر، أي ٤ جرعات من اللقاح إجمالاً؛ يتم تطعيم الرضع (بما في ذلك الأطفال المبتسرين) بلقاح PCV١٣ أو PCV١٥

ج وفقًا لملخص خصائص المنتج، تتكون سلسلة التطعيم من ٣ جرعات لقاح من عمر ٢ إلى ٢٣ شهرًا، وجرعتين لقاح من عمر ٢٤ شهرًا.

د الحد الأدنى للفاصل الزمني منذ الجرعة السابقة: ٦ اشهر

ح جرعتان من التطعيم على فترات لا تقل عن ٥ أشهر؛ الجرعة الثالثة ضرورية بين الجرعة الأولى والثانية للتطعيمات الاستدراكية من عمر ≤ ١٥ عامًا .

ف التطعيم المعزز لـ Td كل ١٠ سنوات. التطعيم القادم المستحق Td كتطعيم بجرعة واحدة على شكل Tdap أو، إذا لزم الأمر، في شكل لقاح مركب Tdap-IPV.

و جرعة واحدة من تطعيم MMR لجميع الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عامًا والذين لديهم حالة تطعيم غير واضحة ولدوا بعد عام ١٩٧٠، والذين لم يتم تطعيمهم أو تلقوا تطعيمًا واحدًا فقط عندما كانوا أطفالاً.

ه التطعيم حتى يتم الوصول إلى عدد ≤ ٣ من جهات اتصال مستضد SARS-CoV-٢ المطلوبة للمناعة الأساسية (منها تطعيم واحد على الأقل). لحد الأدنى لفترة التطعيم بين G١ و G٢ ≤ ٤ ويفضل ١٢ أسبوع، وبين G٢ و G٣ ≤ ٦ أشهر

أ التطعيم ضد PCV٢٠

ي يتم إعطاء تطعيمين بلقاح الهربس النطاقي المساعد مرتين على الأقل ولكن لا يفضل بينهما أكثر من ٦ أشهر.

ك التطعيم السنوي في الخريف

* يمكن توزيع التطعيمات على مواعيد تطعيم متعددة. اللقاح ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ولقاح جدري الماء يمكن حقنهما في الموعد نفسه أو على مسافةٍ زمنية قدرها ٤ أسابيع.

١. RKI، ٢٠٢٤. Epid Bull ٢٠٢٤؛١:٤-٧٢.

MAT-DE-2400751-V1.0-02/2024

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Lützowstr. 107 | 10785 Berlin | impfen.sanofi.de

sanofi