

# Kalendarz szczepień dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Wolnym Kraju Związkowym Saksonia. (stan 01.01.2024)

Szczepionka*	Pouro- dzeniowy	6 tygodnie	2 miesiące	3 miesiące	4 miesiące	6 miesiące	11 miesiące	12 miesiące (1 rok)	14 mie- siące	23 mie- siące	4 lata	5 lata	9 lata	10 lata	25 lata	≥ 50 lata	≥ 60 lata	co 10 lat
<b>Zapalenie wątroby typu B i Zapalenie wątroby typu A (HBV/HAV)</b>	HBV 1/HBV 2 (odstęp > 4 tygodnie)							HBV 3/4 lub HAV 1 ► HAV 2 (odstęp 6–12 miesięcy) lub HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (odstęp > 4 tygodnie) ► HAV/HBV 3 (odstęp 6–12 miesięcy)										
<b>Błonica, tężec, krztusiec *</b>	DTPa 1			DTPa 2	DTPa 3	DTPa 4			DTPa 5			Tdap			Tdap			
<b>Haemophilus influenzae typu b *</b>	Hib 1			*	Hib 2	Hib 3												
<b>Polio (IPV) * (trójwartościowy)</b>	IPV 1			*	IPV 2	IPV 3			IPV 4			IPV						
<b>Odra, świnkę, różyczkę (MMR)</b>	MMR 1			MMR 2			MMR 3†											
<b>Ospę wietrzną (VZV)</b>	VZV 1			VZV 2														
<b>Meningokoki B</b>	Meningokoki (grupa B)																	
<b>Meningokoki ACWY/C</b>	Meningokoki (grupy ACWY/C)																	
<b>Influenza **</b>	Grypa rocznie																	
<b>COVID-19 **</b>																		COVID-19
<b>Pneumokoki ***</b>	PCV 1 ► PCV 2 (odstęp > 2 miesiące), PCV 3 (odstęp > 7 miesięcy)															Pneumo- koki		
<b>Rotawirusy</b>	Rotawirusy																	
<b>Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) ***</b>													≤ 14 lat HPV1 ► HPV 2			≥ 15 lat HPV1 ► HPV2 ► HPV3		
<b>Półpasiec ***</b>																RZV 1 ► RZV 2 (odstęp > 6 miesięcy)		

# Koniecznie należy zapoznać się z charakterystyką produktu dla poszczególnych szczepionek oraz poniższymi tabelami z informacjami dotyczącymi stosowania i częstotliwości szczepień! \* Wszystkie osoby podatne (patrz tabele poniżej) \* W przypadku kombinacji antygenów zawierających składnik krztuscowy w okresie niemowlęcym wymagane są trzy wstrzyknięcia; U noworodków donoszonych można pominąć drugie szczepienie zaplanowane w 3 miesiącu życia, stosując szczepionki 6- lub 5-krotne (schemat marzeń 2 + 1). \*\* Coroczna sezonowa dawka przypominająca zawierająca szczepionkę dostosowaną do krążących wariantów wirusa (COVID-19) lub szczepu (grypy) \*\*\* Preferowane są następujące szczepionki: pneumokoki (od 18 roku życia): 20-walentna skoniugowana szczepionka (PCV20), HPV: szczepionka 9-walentna; półpasiec: rekombinowana szczepionka z adiuwantem (RZV)