

Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene¹

Deutsch



Impfung gegen	Wochen				Monaten							Jahren							
	6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60	
	U4			U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2				
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)															
Tetanus ^b (Wundstarrkrampf)		G1		G2		G3 ^c						A1		A2					A ^e
Diphtherie ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2					A ^e
Pertussis ^b (Keuchhusten)		G1		G2		G3 ^c						A1		A2					A3 ^e
Hib ^b (<i>H. influenzae</i> Typ b)		G1		G2		G3 ^c													
Poliomyelitis ^b (Kinderlähmung)		G1		G2		G3 ^c								A1					
Hepatitis B ^b		G1		G2		G3 ^c													
Pneumokokken ^b		G1		G2		G3 ^c													S ^g
Meningokokken C							G1												
Masern						G1			G2										S ⁱ
Mumps, Röteln						G1			G2										
Varizellen (Windpocken)						G1			G2										
HPV (Humane Papillomviren)														G1 ^d G2 ^d					
Herpes zoster																			G1 ^h G ^h
Influenza (Grippe)																			S _(jährlich)

■ Empfohlener Impfzeitpunkt

■ Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.

b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.

d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich.

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.