

Calendario de vacunación (vacunas sistemáticas) para bebés, niños, jóvenes y adultos¹

Español



Vacuna contra	Edad en Semanas			Meses							Años							
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	a partir de 18	a partir de 60
			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotavirus	G1 ^a		G2	(G3)														
Tétanos ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2				A ^e
Difteria ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2				A ^e
Tosferina ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2				A3 ^e
Hib ^b (<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b)		G1		G2		G3 ^c												
Poliomielitis ^b		G1		G2		G3 ^c								A1				
Hepatitis B ^b		G1		G2		G3 ^c												
Neumococo ^b		G1		G2		G3 ^c												S ^g
Meningococo C							G1											
Sarampión						G1			G2									S ⁱ
Parotiditis, rubéola						G1			G2									
Varicela						G1			G2									
VPH (virus del papiloma humano)														G1 ^d G2 ^d				
Herpes zóster																		G1 ^h G ^h
Gripe																		S (anual)

■ Edad de vacunación recomendada ■ Periodo de administración de dosis de recuerdo para la inmunización básica o primoimmunización de todos los aún no vacunados o para completar una serie de vacunación incompleta

Legenda

G Inmunización básica (en hasta 3 administraciones parciales G1–G3)

A Vacunación de refuerzo

S Vacunación estándar

a Primera dosis a partir de las 6 semanas de vida, 2 o 3 dosis en función de la sustancia a intervalos de al menos 4 semanas

b Bebés prematuros: dosis adicional a los 3 meses de vida, es decir, 4 dosis en total

c Tiempo de espera mínimo respecto a la dosis anterior: 6 meses

d Dos dosis con un tiempo de espera mínimo entre ellas de 5 meses; para la dosis de recuerdo, empezando con >

14 años o con un tiempo de espera entre dosis de < 5 meses, es necesaria una 3.ª dosis entre la 1.ª y la 2.ª.

e Administración de refuerzo de Td cada 10 años. La próxima vacuna Td necesaria, una vez como dosis DTPa o, con la indicación correspondiente, como vacuna combinada DTPa-VPI.

f Dosis única con una vacuna SRP (triple vírica) para todas las personas nacidas después de 1970 de ≥ 18 años con un estado de vacunación incierto, no vacunadas o con una sola vacunación en la niñez

g Administración de la vacuna polisacárida 23-valente

h Vacuna de dos dosis con la vacuna inactivada adyuvante contra el herpes zóster con un tiempo entre dosis de 2 meses como mínimo y de 6 meses como máximo

* Las vacunas se pueden repartir entre varias visitas. La SRP y la SRPV se pueden administrar en la misma visita o con un intervalo de 4 semanas.