



Vaccin	Naștere	7 săpt. <sup>1</sup>	3 lun. <sup>1</sup>	4 lun. <sup>1</sup>	5 lun. <sup>1</sup>	6 lun. <sup>1</sup>	12 lun. <sup>1</sup>	13 lun. <sup>1</sup>	15 lun. <sup>1</sup>	24 lun. <sup>1</sup>	5 ani <sup>1</sup>	6 ani <sup>1</sup>	10 ani <sup>1</sup>	11 ani <sup>1</sup>	18 ani <sup>1</sup>	26 ani <sup>1</sup>	la fiecare 10 ani	peste 50 ani	peste 60 ani
Hepatita B <sup>3,6</sup> și Hepatita A <sup>6</sup> (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 <sup>3</sup>						HBV 3/4 <sup>3</sup> sau HAV/HBV <sup>6</sup>			HAV/HBV <sup>6</sup>								
Difterie, tetanos, pertussis <sup>2,3,4</sup>			1. DTPa	2. <sup>3</sup> DTPa	3. DTPa			4. DTPa				5. DTPa sau Tdpa <sup>4</sup>		Tdpa			Tdpa		
Haemophilus influenzae Tip b <sup>2,3</sup>			1. Hib	<sup>3</sup>	2. Hib			3. Hib											
Polio (IPV) <sup>2,3</sup> (trivalent)			1. IPV	<sup>3</sup>	2. IPV			3. IPV						4. IPV			IPV		
Rujeolă, oreion, rubeolă (MMR) <sup>13</sup>							1. MMR		2. MMR				3. MMR <sup>13</sup>						
Varicelă (VZV) <sup>5</sup>							1.VZV		2.VZV										
Meningococi B <sup>12</sup>			Meningococi (Grupa B)																
Meningococi ACWY/C <sup>7</sup>			Meningococi (Grupele ACWY/C)																
Gripă <sup>8</sup>														anual <sup>8</sup>					
Pneumococi						Pneumococi <sup>9</sup>											Pneumococi		
Rotavirusuri <sup>10</sup>			Rotavirusuri																
Virusul Papiloma uman (HPV) <sup>11</sup>													HPV						
Herpes zoster (zona zoster)																		Herpes zoster (zona zoster)	

\* SIKO = Comisia de vaccinare din Saxonia

Versiune: 09/2022

- Definiții legate de timp: De ex.: Luna a 3-a = începând cu luna a 3-a După împlinirea a 2 luni, Săptămâna a 7-a = începând cu săptămâna a 7-a După împlinirea a 6 săptămâni Al 6-lea an de viață = începând cu cea de-a 5-a zi de naștere
- Intervale de timp între vaccinări 1–3 resp. între 1 și 2 min. 4 săptămâni, între cea de-a 3-a și a 4-a resp. a 2-a și a 3-a vaccinare pentru completarea imunizării de bază min. 6 luni.
- Pentru combinațiile de antigen, care conțin o componentă pertussis, sunt necesare 3 injecții la vârsta sugarului. La cei născuți la termen (adică cei născuți după cea de-a 37-a săptămână de sarcină) în cazul utilizării de vaccini 6-valente sau 5-valente (a se respecta informațiile de specialitate) care conform calendarului de vaccinare sunt prevăzute în cea de-a 4-a lună de viață (în vârstă de 3 luni) vaccinarea cea de-a 2-a este anulată (conform schemei de vaccinare 2+1 în baza recomandărilor 2020/2021 STIKO la RKI). Acest lucru are ca rezultat un interval de cel puțin 8 săptămâni între vaccinările 1 (a 3-a lună de viață) și 2 (a 5-a lună de viață). Intervalul dintre vaccinările 3 și 4 (cu schema de vaccinare 3 + 1) sau 2 și 3 (cu schema de vaccinare 2 + 1) este de cel puțin 6 luni.
- Începând cu cel de-al 6-lea an Respectați informațiile de specialitate despre vaccinuri cu privire la limita de vârstă în ceea ce privește conținutul redus de di-tioxid.
- Toți copiii în vârstă de 11 și 12 ani care au primit vaccinul rapel.
- Începând cu cel de-al 2-lea an Se recomandă o vaccinare combinată HAV/HBV, dacă imunizarea de bază împotriva HBV nu a fost începută la vârsta de sugar; dacă da, atunci se va vaccina Hepalita A monovalent.
- În primul an 2 injecții (a se respecta indicațiile producătorului), începând cu cel de-al 2-lea an 1 injecție. În cazul vaccinării la vârsta de sugar se recomandă o creștere după cel de-al 2-lea an de viață. Vaccinările trebuie efectuate cu un vaccin tetravalent conjugat (serogrupul ACWY) conform aprobării de vârstă.  
Toți copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani: Vaccinarea de rapel sau vaccinarea primară cu un vaccin conjugat tetravalent (serogrupuri A, C, W, Y).
- După împlinirea a 6 luni de viață.
- Vaccinarea standard este recomandată până la a 24-a lună de viață. În conformitate cu schema de imunizare respectivă cu vaccin conjugat; pentru copii după cea de-a 24-a lună de viață, se recomandă doar vaccinurile cu indicație.
- Vaccinarea orală cu 2 sau 3 doze (a se respecta indicațiile producătorului), vaccinare simultană a se vedea E1, pagina 8 și 14 (notă de subsol \*\*\*\*\*).
- Toate fețele și femeile; toți băieții și bărbații au preferat vaccinul 9-valent, respectați schema de vaccinare a producătorului (schema de 2 sau 3 doze, în funcție de vârsta la care se face vaccinarea).
- Programul de vaccinare conform instrucțiunilor producătorului; este posibilă vaccinarea simultană cu D, T, Pa, Hib, IPV, HBV, vaccin pneumococic conjugat, MMR, VZV (fiecare monovalent sau în combinație).
- La vaccinarea pentru prima oară în primul an de viață, precum și la vaccinarea pentru prima și a doua oară până la sfârșitul celui de-al patrulea an de viață.