

# Calendarul vaccinărilor pentru copii, adolescenți și adulți în landul Saxonia liberă. (stare 01.01.2024)



Vaccin#	Postnatal	6 săptămâni	2 luni	3 luni	4 luni	6 luni	11 luni	12 luni (1 an)	14 luni	23 luni	4 ani	5 ani	9 ani	10 ani	25 ani	≥ 50 ani	≥ 60 ani	la fiecare 10 ani	
<b>Hepatita B și Hepatita A (HBV/HAV)</b>		VHB 1/VHB 2 (interval > 4 săptămâni)						VHB 3/4 sau VHA 1 ► VHA 2 (interval 6–12 luni) sau HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (interval > 4 săptămâni) ► HAV/HBV 3 (interval 6–12 luni)											
<b>Difterie, tetanos, pertussis *</b>			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3			DTPa 4			DTPa 5		Tdap					Tdap	
<b>Haemophilus influenzae tip b *</b>			Hib 1	*	Hib 2			Hib 3											
<b>Poliomielita (IPV) * (trivalent)</b>			IPV 1	*	IPV 2			IPV 3					IPV 4					IPV	
<b>Rujeolă, oreion, rubeola (MMR)</b>							MMR 1		MMR 2			MMR 3 <sup>‡</sup>							
<b>Varicelă (VZV)</b>							VZV 1		VZV 2										
<b>Meningococi B</b>							Meningococil (grupa B)												
<b>Meningococi ACWY/C</b>							Meningococi (grupele ACWY/C)												
<b>Influenza **</b>							Influenza anual												
<b>COVID-19 **</b>																		COVID-19	
<b>Pneumococi ***</b>			PCV 1 ► PCV 2 (interval > 2 luni), PCV 3 (interval > 7 luni)																Pneumococi
<b>Rotavirus</b>			Rotavirus																
<b>Papilomavirusuri umane (HPV) ***</b>												≤ 14 ani HPV1 ► HPV 2 ≥ 15 ani HPV1 ► HPV2 ► HPV3							
<b>Herpes zoster ***</b>																RZV 1 ► RZV 2 (interval >6 luni)			

# Este esențial să respectați rezumatul caracteristicilor produsului pentru vaccinurile respective și următoarele tabele cu informații despre intervalele de aplicare și vaccinare! \* Toate persoanele susceptibile (vezi tabelele de mai jos) \* Pentru combinațiile de antigeni care conțin o componentă pertussis, sunt necesare trei injecții în copilărie; La sugarii la termen, a doua vaccinare planificată la vârsta de 3 luni poate fi omisă atunci când se utilizează vaccinuri de 6 sau 5 ori (așa-numita schemă 2 + 1). \*\* Rapel sezonier anual cu un vaccin adaptat la variantele de virus circulant (COVID-19) sau tulpina (gripa) \*\*\* Următoarele vaccinuri sunt recomandate ca preferință: pneumococi (de la vârsta de 18 ani): vaccin conjugat 20-valent (PCV20), HPV: vaccin cu 9 valențe; herpes zoster: vaccin recombinant, cu adjuvant (RZV)