

Kalendar cijepljenja (standardna cijepljenja) za dojenčad, djecu, mlade i odrasle¹

Hrvatski



Cijepljenje	Starosna dob u		Mjesecima													Godinama					
	Tjednima		6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	od 18	od 60	
			U4			U5			U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2		
Rotavirusi			G1 ^a	G2	(G3)																
Tetanus ^b			G1		G2		G3 ^c							A1		A2			A'		
Difterija ^b			G1		G2		G3 ^c							A1		A2			A'		
Pertussis ^b			G1		G2		G3 ^c							A1		A2			A3'		
Hib ^b – H. influenzae Tip b			G1		G2		G3 ^c														
Poliomijelitis ^b			G1		G2		G3 ^c									A1					
Hepatitis B ^b			G1		G2		G3 ^c														
Pneumokoki ^b			G1		G2		G3 ^c														S
NOVI Meningokoki B ^b			G1		G2			G3 ^c													
Meningokoki C								G1													
Ospice								G1		G2											S ^e
Zaušnjaci, rubeola								G1		G2											
Varičele								G1		G2											
HPV – humani papilomavirusi																G1 ^a	G2 ^a				
Herpes zoster																					G1 G2
Influenza																					S (godišnje) ^a
NOVI COVID-19																					G1 ^a , G2 ^a , G3 ^a S (godišnje) ^a

■ Preporučeno vrijeme cijepljenja

 Vrijeme nadoknade za osnovnu, tj. prvu imunizaciju onih osoba koje još nisu cijepljene, tj. za upotpunjavanje nepotpune serije cijepljenja

Objašnjenja

G Osnovna imunizacija (može obuhvatati do 3 cijepljenja G1–G3)

A Ponovno cijepljenje

S Standardno cijepljenje

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

- Prva doza cjeviva već od navršenih 6 tjedana života, ovisno o korištenom cjevivu 2, tj. 3 doze cjeviva u razmaku od najmanje 4 tjedna.
- Nedonoščad: dodatna doza cjeviva u dobi od 3 mjeseca, odnosno ukupno 4 doze cjeviva; dojenčad (uključujući nedonoščad) se cijepi s PCV13 ili PCV15
- Prema sažetku opisa svojstava lijeka, serija cijepljenja sastoji se od 3 doze cjeviva u dobi od 2 do 23 mjeseca i 2 doze cjeviva u dobi od 24 mjeseca.
- Minimalni vremenski razmak u odnosu na prethodnu dozu: 6 mjeseci.
- Dvije doze cjeviva u razmaku od najmanje 5 mjeseci, u slučaju nadoknade cjeviva počevši u dobi od ≥ 15 godina ili ako razmak između cijepljenja iznosi < 5 mjeseci, između 1. i 2. doze potrebna je 3. doza.
- Ponovno cijepljenje protiv tetanusa i difterije svakih 10 godina. Sljedeće po redu cijepljenje protiv tetanusa i difterije kao Tdap cijepljenje, tj. u slučaju odgovarajuće indikacije kao kombinirano cijepljenje Tdap-IPV.

g Jednokratno cijepljenje MMR cjevivom za sve osobe rođene nakon 1970. ≥ 18 godina s nejasnim statusom cijepljenja, bez cijepljenja ili samo s jednim cijepljenjem tijekom djetinjstva.

h Cijepljenje dok se ne postigne broj od ≥ 3 kontakta sa SARS-CoV-2 antigenom koji su potrebni za osnovni imunitet (od čega najmanje 1 cijepljenje). Minimalni interval cijepljenja između G1 i G2 ≥ 4 do poželjno 12 tjedana, a između G2 i G3 ≥ 6 mjeseci

i Cijepljenje s PCV20

j Dvokratno cijepljenje adjuvantiranim, neaktivnim cjevivom protiv herpes zosteru, u razmaku od najmanje 2 do najviše 6 mjeseci.

k Godišnje cijepljenje u jesen

* Cijepljenja se mogu raspodijeliti na više termina cijepljenja. MMR i V mogu se davati na istom terminu ili u razmaku od 4 tjedana.