



Vaksina	Ditëlindja	7. javë <sup>1</sup>	3. muaj <sup>1</sup>	4. muaj <sup>1</sup>	5. muaj <sup>1</sup>	6. muaj <sup>1</sup>	12. muaj <sup>1</sup>	13. muaj <sup>1</sup>	15. muaj <sup>1</sup>	24. muaj <sup>1</sup>	5. vjeç <sup>1</sup>	6. vjeç <sup>1</sup>	10. vjeç <sup>1</sup>	11. vjeç <sup>1</sup>	18. vjeç <sup>1</sup>	26. vjeç <sup>1</sup>	të gjithë 10 vjeç	mbi 50 vjeç	mbi 60 vjeç	
Hepatitis B <sup>3,6</sup> dhe Hepatitis A <sup>6</sup> (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 3							HBV 3/4 3 ose HAV/HBV 6		HAV/HBV <sup>6</sup>									
Difteri, tetanoz, Pertusis (Kollë e mirë) <sup>2,3,4</sup>			1. DTPa	2. <sup>3</sup> DTPa	3. DTPa			4. DTPa			5. DTPa ose Tdpa <sup>4</sup>			Tdpa				Tdpa		
Haemophilus influenzae Lloji b <sup>4,3</sup>			1. Hib	<sup>3</sup>	2. Hib			3. Hib												
Poliomelit (IPV) <sup>2,3</sup> (trivalent)			1. IPV	<sup>3</sup>	2. IPV			3. IPV					4. IPV				IPV			
Fruthi, shytat, Rubeola (MMR) <sup>13</sup>							1. FSHR	2. FSHR					3. FSHR <sup>13</sup>							
Varicela (Lia e dhene) (VZV) <sup>5</sup>							1.VZV	2.VZV												
Meningokok B <sup>12</sup>		Meningokok (Grupi B)																		
Meningokok ACWY/C <sup>7</sup>		Meningokok (Grupi ACWY/C)																		
Influenca <sup>8</sup>		në vit <sup>8</sup>																		
Pneumokok		Pneumokokët <sup>9</sup>																	Pneumokok	
Rotavirusi <sup>10</sup>		Rotavirusi																		
Viruset Papilo Humane (HPV) <sup>11</sup>													HPV							
Herpes zoster																			Herpes zoster	

\* SIKO = Komisioni Sakson i Vaksinimit

Gjendja: 09/2022

- Përkufizimi i afateve kohore: Do të thotë p.sh.: Muaji i 3-të = nga 3. Muaji = përfunduar në të 2-ën. Muaji; 7. Java = nga 7. Java = përfunduar në 6-të. Java; moshë 6 vjeç = nga 5. Ditëlindja.
- Intervali midis vaksinimeve 1–3 përkatësisht 1 dhe 2 të paktën 4 javë, midis 3 dhe 4 përkatësisht 2 dhe 3. Vaksinimi për të përfunduar vaksinimin bazë të paktën 6 muaj.
- Për kombinimet e antigjenit, që përmbajnë një përbërës të pertusis, kërkohen 3 injeksione në foshnjëri. Në rastin e foshnjave me kohë të plotë (d.m.th. të lindurit pas javës 37 të shtatzënisë) vaksinimi i dytë i planifikuar për muajin e 4-të jetës (në moshën 3 muajsh) sipas kalendarit të vaksinimit në muajin e 4-të të jetës (në moshën 3 muajsh) mund të hiqet nëse përdoren vaksina 6 ose 5-fish (shikoni informacionin teknik) në orarin e vaksinimit 2+1 sipas rekomandimeve 2020/2021 e Komisionit të Vaksinimit (STIKO) të RKI). Kjo rezulton në një interval prej të paktën 8 javësh midis vaksinimit 1 (muaji i 3-të i jetës) dhe 2 (muaji i 5-të i jetës). Intervali midis vaksinimeve 3 dhe 4 (për plan vaksinimi 3+1) ose 2 dhe 3 (për plan vaksinimi 2+1) është të paktën 6 muaj.
- Nga moshë 6. vjeç Vini re informacionet e specializuara për vaksinat për shkak të kufizimit të moshës në lidhje me përmbajtjen e zvogëluar të dyoksidit.
- Të gjithë fëmijët/adoleshentët e pa vaksinuar me histori negative të varicelës dhe të gjithë të rriturit me ndjeshmëri të lartë duhen vaksinuar.
- nga moshë 2. vjeç Vaksinimi i kombinuar HAV/HBV rekomandohet nëse imunizimi përësor kundër HBV nuk ka filluar në foshnjëri; nëse po, atëherë vaksinoni në mënyrë monovalente hepatitisin A.
- Në moshën 1. vjeç 2 injeksione (Vini re udhëzimet e prodhuesit), nga moshë 2. vjeç 1 injeksion. Kur vaksinohen në foshnjëri, rekomandohet një përfurcues në moshën 2. vjeç. Vaksinimet duhet të jepen me një vaksinë tetraivalente e konjuar (serogrupi ACWY) në përputhje me afatet e moshës.  
Të gjithë fëmijët dhe adoleshentët nga moshë 11. vjeç deri në përfundimin e moshës 18 vjeç. Moshë: Vaksinim përfurcues ose vaksinimi i parë tetraivalent i konjuar (grupi i mikroorganizmave ACWY) sipas moshës.
- Nga përfundimi i moshës 6. muajsh.
- Vaksinimi standard rekomandohet deri në moshën 24 muajsh sipas skemës së imunizimit me vaksinën e konjuar, për fëmijët nga moshë 24 muajsh rekomandohet vetëm vaksinim i ndikativ.
- Vaksinimi oral me 2 ose 3 doza (shikoni udhëzimet e prodhuesit), vaksinimi i njëkohshëm shih E1, faqet 8 dhe 14 (shënimi \*\*\*\*\*).
- Të gjitha vajzat dhe gratë; të gjithë djemtë dhe burrat preferohen me vaksinë 9-valentore; Shikoni orarin e vaksinimit të prodhuesit (orari me 2 ose 3 doza, në varësi nga moshë e vaksinimit).
- Skema e vaksinimit sipas udhëzimeve të prodhuesit; është i mundur vaksinimi në të njëjtën kohë me D, T, Pa, Hib, IPV, HBV, vaksina konjuar dhe pneumokokut, MMR, VZV (secila monovalente ose në kombinim).
- Për vaksinimin e parë në moshën 1-vjeçare, si dhe për vaksinimin e parë dhe të dytë deri në moshën e plotë 4-vjeçare.