

Calendrier des vaccinations pour les enfants, les adolescents et les adultes de l'État libre de Saxe. (Statut 01.01.2024)

Vaccin#	Postnatal	6 semaines	2 mois	3 mois	4 mois	6 mois	11 mois	12 mois (1 an)	14 mois	23 mois	4 ans	5 ans	9 ans	10 ans	25 ans	≥ 50 ans	≥ 60 ans	tous les 10 ans		
Hépatite et Hépatite A (VHB/VHA)	HBV 1/ HBV 2 (intervalle > 4 semaines)							HBV 3/4 ou HAV 1 ► HAV 2 (intervalle 6–12 mois) ou VHA/VHB 1 ► VHA/VHB 2 (intervalle > 4 semaines) ► VHA/VHB 3 (intervalle 6–12 mois)												
Diphtérie, tétanos, coqueluche *			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3			DTPa 4			DTPa 5			Tdap					Tdap	
Haemophilus influenzae type b *			Hib 1	*	Hib 2			Hib 3												
Polio (VPI) * (trivalent)			IPV 1	*	IPV 2			IPV 3						IPV 4					IPV	
Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)							MMR 1		MMR 2			MMR 3*								
Varicelle (VZV)							VZV 1		VZV 2											
Méningocoques B			Méningocoques (groupe B)																	
Méningocoques ACWY/C			Méningocoques (groupes ACWY/C)																	
Influenza **			Influenza chaque année																	
COVID-19 **																			COVID-19	
Pneumocoques ***			PCV 1 ► PCV 2 (intervalle > 2 mois), PCV 3 (intervalle > 7 mois)																	Pneumocoques
Rotavirus		Rotavirus																		
Papillomavirus humain (HPV) ***													≤ 14 ans HPV1 ► HPV 2 ≥ 15 ans HPV1 ► HPV2 ► HPV3							
Herpès zoster ***																RZV 1 ► RZV 2 (intervalle >6 mois)				

Il est impératif de respecter le résumé des caractéristiques du produit pour les vaccins respectifs ainsi que les tableaux suivants contenant des informations sur les intervalles d'application et de vaccination ! * Toutes les personnes sensibles (voir tableaux ci-dessous). * Pour les combinaisons d'antigènes contenant un composant coquelucheux, trois injections sont nécessaires pendant la petite enfance ; Chez les nourrissons nés à terme, la deuxième vaccination prévue à 3 mois peut être omise en cas d'utilisation de vaccins 6 ou 5 fois (ce qu'on appelle le schéma 2 + 1). ** Rappel saisonnier annuel avec un vaccin adapté aux variantes du virus circulant (COVID-19) ou à la souche (grippe) *** Les vaccins suivants sont recommandés de préférence : pneumocoques (à partir de 18 ans) : vaccin conjugué 20-valent (PCV20), VPH ; HPV : vaccin 9-valent ; Herpès zoster : vaccin recombinant adjuvanté (RZV).