الجداول الزمنية الصادرة عن لجنة اللقاحات الساكسونية للقاحات الأطفال واليافعين والبالغين في ولاية ساكسونيا الحرة

اللقاح	الولادة	7 أسابيع [1]	3 أشهر [1]	4 أشهر [1]	5 أشهر [1]	6 أشهر [1]	12 أشهر [1]	13 أشهر [1]	15 أشهر [1]	24 أشهر [1]	5 سنوات [1]	6 سنوات [1]	10 سنوات [1]	11 سنة [1]	18 سنة [1]	26 سنة [1]	كل 10 سنوات	فوق 50 سنة	فوق 60 سنة
التهاب الكبد الوبائي ب [3، 6] والتهاب الكبد الوبائي أ [6]			التهاب الكبد الوبائي ب 1/التهاب الكبد الوبائي ب 2 [3]				التهاب الكبد الوبائي ب 3/4 [3] أو التهاب الكبد الوبائي أ/التهاب الكبد الوبائي ب [6]							التهاب الكبد الوبائي أ/التهاب الكبد الوبائي ب [6]					
الخناق، والتيتانوس، والسعال الديكي [2، 3، 4]				الجرعة الأولى ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الثانية ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الأولى ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي			الجرعة الرابعة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي		الجرعة الخامسة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي ولقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي [4]		لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي			لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي		
المستدمية النزلية النوع ب [2، 3]			الجرعة الأولى ضد المستدمية النزلية	3	الجرعة الثانية ضد المستدمية النزلية				الجرعة الثالثة ضد المستدمية النزلية										
شلل الأطفال [2، 3] (ثلاثي التكافؤ)			الجرعة الأولى ضد شلل الأطفال	3	الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال				الجرعة الثالثة ضد شلل الأطفال				الجرعة الرابعة ضد شلل الأطفال			لقاح شلل الأطفال		
الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية [13]							1. الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية		2. الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية			3. الحصبة، والنكاف والحصبة الألمانية [13]						
جدري الماء [5]							الجرعة الأولى ضد فيروس جدري الماء النطاقي		الجرعة الثانية ضد فيروس جدري الماء النطاقي									
المكورات السحائية ب [12]		المكورات السحائية (مجموعة ب)																
المكورات السحائية ACWY/C [7]		المكورات السحائية (مجموعات ACWY/C)																
الإنفلونزا [8]		سنويًا [8]																
المكورات الرئوية							المكورات الرئوية [9]											المكورات الرئوية
الفيروسات العجلية [10]							الفيروسات العجلية											
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) [11]															فيروس الورم الحليمي البشري			
الهربس النُطاقي																	الهربس النُطاقي	

* لجنة اللقاحات الساكسونية، واختصارها (SIKO)

إصدار: 09/2022

1 تعريف بيانات السنّ: ويقصد بها مثلاً: الشهر الثالث = ابتداءً من الشهر الثالث = اكتمال الشهر الثاني؛ الأسبوع السابع = ابتداءً من الأسبوع السابع = اكتمال الأسبوع السادس؛ عمر 6 سنوات = ابتداءً من عيد الميلاد الخامس.

2 الفترات الزمنية بين اللقاحات 1 – 3 أو 1 و 2 هي 4 أسابيع على الأقل، وبين اللقاح الثالث والرابع أو الثاني والثالث 6 أشهر على الأقل لإتمام التحصين الأساسي.

3 في حال تَولِيفات مولِّدات المضادات، التي تحتوي على مكونات السعال الديكي، من الضروري حصول الطفل في سن الرضاعة على 3 حُقن طيبة. في حالة الرُضَّع حديثي الولادة بعد انتهاء مدة الحمل كاملة (أي المولودين بعد انتهاء أسبوع الحمل السابع والثلاثين) عند استخدام لقاحات سداسية أو خماسية الأضعاف (التزم بمراعاة المعلومات المتخصصة)، يمكن ألا يعطى اللقاح الثاني المقترَض حسب الجدول الزمنيّ للقاحات في الشهر الرابع (في عمر 3 أشهر) (نظام اللقاحات 1+2 بما يتماشى مع تَوصيات 2021/2020 لدى معهد روبرت كوخ). تنتج عن ذلك مسافةٌ زمنيةٌ فاصلة قدرها 8 أسابيع على الأقل بين اللقاحين 1 (الشهر الثالث) و2 (الشهر الخامس). وتبلغ المسافة الزمنية الفاصلة بين اللقاحين و4 (لدى نظام اللقاحات 1+3) أو بين 2 و3 (لدى نظام اللقاحات 1+2) 6 أشهر على الأقل.

4 تُراعى بدءًا من سن 6 سنوات المعلومات المتخصصة عن اللقاحات ذات الصلة بالحد الأدنى للسن فيما يتعلق بتقليل محتوى ثنائي التوكسويد (السم المُضعف).

5 جميع الأطفال/اليافعين غير الحاصلين على اللقاح وليست لديهم سيرة مَرَضيّة للإصابة بجدري الماء وجميع البالغين المعرضين للإصابة على اعتبار أنه لقاح لاحق.

6 يُنصح ابتداءً من عمر سنتين بمزيج من اللقاحات ضد التهاب الكبد أ/التهاب الكبد ب، في حال عدم البدء باللقاح الأساسي ضد التهاب الكبد ب في سن الرضاعة؛ أما في حال البدء باللقاح في سن الرضاعة، فيكفي اللقاح ضد التهاب الكبد أ بلقاح أحادي التكافؤ.

7 ننصح، في عمر سنة واحدة، بعد حقنتين طبيتين (تراعى بيانات الشركة المنتجة)، وننصح بدءًا من عمر سنتين بحقنة واحدة. وفي حال إعطاء اللقاح في سن الرضاعة، ننصح بجرعة منشطة بدءًا من عمر سنتين. ننصح بإعطاء اللقاحات باستخدام لقاح مقترن رباعي التكافؤ (مجموعات المصل ACWY) بحسب المسموح به للمرحلة العمرية. جميع الأطفال واليافعين بدءًا من سن 11 وحتى إتمام سن 18: لقاح مُنشِّط أو اللقاح الأول باستخدام لقاح مقترن رباعي التكافؤ (مجموعات المصل A، و C، و W، و Y).

8 بدءًا من إتمام سن 6 أشهر.

9 ننصح باللقاح القياسي حتّى سن 24 شهرًا بحسب نظام التطعيم المعني وباستخدام لقاح مقترن، وننصح باللقاحات الوقائية فقط للأطفال بعد سن 24 شهرًا.

10 اللقاح الفموي بجرعتين أو 3 جرعات (تُراعى بيانات الشركة المنتجة)، اللقاح المتزامن السلبي والنشط، راجع E1، الصفحتين 8 و14 (الهامش ******).

11 يُفضّل استخدام لقاح تساعي التكافؤ على جميع الفتيات والسيدات وجميع اليافعين والرجال؛ مع أخذ أنظمة اللقاحات الصادرة عن الشركة المنتجة بالحسبان (نظام الجرعتين أو الثلاث جرعات، بحسب سن اللقاح).

12 نظام اللقاح بحسب بيانات الشركة المنتجة؛ اللقاح المتزامن السلبي والنشط باستعمال لقاح الخناق D، التيتانوس T، السعال الديكي Pa، المستدمية النزلية Hib، شلل الأطفال IPV، التهاب الكبد ب HBV، اللقاح المقترن ضد المكورات الرئوية، لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR، لقاح جدري الماء النطاقي VZV (إما أحادي التكافؤ أو بالتوليف)، جميعها ممكنة.

13 عند التطعيم الأول في السنة الأولى من العمر وكذلك عند التطعيم الأول والثاني حتى إتمام السنة الرابعة من العمر.

MAT-DE-2300291-1.0-01/2023