



Vacuna	Edad	7 sem. ¹	3 meses ¹	4 meses ¹	5 meses ¹	6 meses ¹	12 meses ¹	13 meses ¹	15 meses ¹	24 meses ¹	5 años ¹	6 años ¹	10 años ¹	11 años ¹	18 años ¹	26 años ¹	cada 10 años	+ 50 años	+ 60 años
Hepatitis B ^{3,6} y hepatitis A ⁶ (VHB/VHA)		VHB 1/VHB 2 ³						VHB 3/4 ³ o VHA/VHB ⁶		VHA/VHB ⁶									
Difteria, tétanos, tosferina ^{2,3,4}		1. DTPa	2. ³ DTPa	3. DTPa				4. DTPa			5. DTPa o Tdpa ⁴			Tdpa			Tdpa		
Haemophilus influenzae tipo b ^{2,3}		1. Hib	3	2. Hib				3. Hib											
Poliomielitis (VPI) ^{2,3} (trivalente)		1. VPI	3	2. VPI				3. VPI						4. VPI			VPI		
Triple vírica (SRP) ¹³							1. SRP	2. SRP					3. SRP ¹³						
Varicela (VVZ) ⁵							1.VVZ	2.VVZ											
Meningococo B ¹²		Meningococo (grupo B)																	
Meningococos ACWY/C ⁷		Meningococos (grupos ACWY/C)																	
Gripe ⁸														anual ⁸					
Neumococo						Neumococo ⁹											Neumococo		
Rotavirus ¹⁰		Rotavirus																	
Virus del papiloma humano (VPH) ¹¹														VPH					
Herpes zóster																			Herpes zóster

*SIKO = Comité de Sajonia sobre la Vacunación

Actualización: 09/2022

- Indicación de los periodos: significan, p. ej.: 3 meses = desde el 3.er mes = 2.º mes completado; 7 sem. = desde la 7.ª semana = 6.ª semana completada; 6 años = desde el 5.º cumpleaños.
- Tiempo entre las vacunaciones 1–3 o 1 y 2, al menos 4 semanas; entre la 3.ª y la 4.ª o la 2.ª y la 3.ª vacunaciones para completar la inmunización básica, al menos 6 meses.
- Las combinaciones de antígenos que contienen un componente de tosferina requieren 3 inyecciones durante la lactancia. En los lactantes nacidos a término (después de la 37.ª semana de gestación), en caso de administración de 6 o 5 dosis de vacuna (consultar las características del producto), la 2.ª vacuna del 4.º mes de vida (a la edad de 3 meses) prevista en el calendario de vacunación se puede suprimir (pauta de vacunación 2+1 conforme a las recomendaciones de la STIKO de 2020/2021 en el Instituto Robert Koch). De ello se origina un lapso de al menos 8 semanas entre las vacunas 1 (3.er mes de vida) y 2 (5.º mes de vida). El tiempo entre las vacunas 3 y 4 (con la pauta de vacunación 3+1) o 2 y 3 (con la pauta de vacunación 2+1) es de al menos 6 meses.
- A partir de los 6 años, consultar las características de las vacunas debido a las restricciones de edad respecto al contenido reducido de dos toxoides.
- Todos los niños/jóvenes no vacunados con antecedentes negativos de varicela y todos los adultos susceptibles como dosis de recuerdo.
- A partir de los 2 años, en caso de que no se haya comenzado la inmunización básica contra el VHB durante la lactancia, se recomienda la administración de una vacuna combinada contra el VHA/VHB; de lo contrario, se recomienda una vacuna monovalente frente a la hepatitis A.
- En el 1.er año, 2 inyecciones (consultar las indicaciones del fabricante); a partir del 2.º año, 1 inyección. Durante la lactancia, se recomienda administrar una dosis de refuerzo a partir del 2.º año. Las vacunas se deben administrar con una vacuna tetravalente conjugada (serogrupos ACWY) según la clasificación por edad. Todos los niños y jóvenes desde los 11 años hasta haber cumplido los 18: vacunación de refuerzo o vacunación inicial con una vacuna tetravalente conjugada (serogrupos ACWY).
- Desde el 6.º mes completado.
- Se recomienda la vacunación normalizada hasta los 24 meses según las pautas de inmunización correspondientes con la vacuna conjugada. En niños con más de 24 meses, se recomienda administrar solo las vacunas indicadas.
- Vacunas orales con 2 o 3 dosis (consultar las indicaciones del fabricante), vacunación simultánea v. E1, pág. 8 y 14 (nota al pie*****).
- Todas las jóvenes y mujeres, todos los jóvenes y hombres preferiblemente con vacuna nonavalente; seguir las pautas de vacunación de los fabricantes (pauta de 2 o 3 dosis, según la edad de vacunación).
- Pauta de vacunación según las indicaciones del fabricante; vacunación simultánea contra D, T, Pa, Hib, VPI, VHB, vacuna antineumocócica conjugada, SRP, VVZ (en cada caso, monovalente o combinada) posible.
- En caso de primera vacunación en el primer año de vida, así como en caso de primera y segunda vacunación hasta cumplidos los cuatro años de edad.