

Lịch tiêm chủng dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn ở Bang tự do Sachsen. (trạng thái: 01.01.2024)

Vắc-xin#	Sau sinh	6 tuần	2 tháng	3 tháng	4 tháng	6 tháng	11 tháng	12 tháng (1 năm)	14 tháng	23 tháng	4 năm	5 năm	9 năm	10 năm	25 năm	≥ 50 năm	≥ 60 năm	cứ sau 10 năm
Viêm gan B và viêm gan A (HBV/HAV)	HBV 1/HBV 2 (khoảng cách > 4 tuần)							HBV 3/4 hoặc HAV 1 ► HAV 2 (khoảng thời gian > 6–12 tháng) hoặc HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (khoảng cách > 4 tuần) ► HAV/HBV 3 (khoảng thời gian > 6–12 tháng)										
Bạch hầu, uốn ván, ho gà *			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3			DTPa 4			DTPa 5			Tdap				Tdap
Haemophilus influenzae týp b *			Hib 1	*	Hib 2			Hib 3										
Viêm đa cơ (IPV) * (hoá trị ba)			IPV 1	*	IPV 2			IPV 3						IPV 4				IPV
Sởi, quai bị, bệnh sởi (MMR)							MMR 1	MMR 2					MMR 3 [†]					
Thủy đậu							VZV 1	VZV 2										
Viêm màng não mô cầu B							Viêm màng não mô cầu (nhóm B)											
Viêm màng não mô cầu ACWY/C							Viêm màng não mô cầu (nhóm ACWY/C)											
Cúm **							Cúm hàng năm											
COVID-19 **																		COVID-19
Phế cầu khuẩn ***			PCV 1 ► PCV 2 (khoảng thời gian > 2 tháng), PCV 3 (khoảng thời gian > 7 tháng)													Phế cầu khuẩn		
Virus rota			Virus rota															
Virus gây u nhú ở người (HPV) ***													≤ 14 năm HPV1 ► HPV 2 ≥ 15 năm HPV1 ► HPV2 ► HPV3					
Zona thần kinh ***															RZV 1 ► RZV 2 (khoảng thời gian > 6 tháng)			

Điều cần thiết là phải quan sát bản tóm tắt các đặc tính sản phẩm của các loại vắc xin tương ứng và các bảng sau đây với thông tin về thời gian áp dụng và tiêm chủng! † Tất cả những người dễ bị tổn thương (xem bảng bên dưới) * Đối với sự kết hợp kháng nguyên có chứa thành phần ho gà, cần tiêm ba mũi ở trẻ nhỏ; Ở trẻ đủ tháng, có thể bỏ qua mũi tiêm chủng thứ hai dự kiến vào lúc 3 tháng tuổi khi sử dụng vắc xin gấp 6 hoặc 5 lần (cái gọi là sơ đồ 2 + 1). ** Tăng cường theo mùa hàng năm bằng vắc xin thích ứng với các biến thể vi rút đang lưu hành (COVID-19) hoặc chủng vi rút (cúm) *** Các loại vắc-xin sau đây được khuyến cáo ưu tiên: phế cầu khuẩn (từ 18 tuổi); vắc-xin liên hợp 20 giá trị (PCV20), HPV: vắc xin 9 giá; Herpes zoster: vắc xin tái tổ hợp, bổ trợ (RZV)