

Kalendari i vaksinimit (vaksinat standarde) për foshnja, fëmijë, adoleshentë dhe të rritur¹

Shqip



	Moshë në	Muaj															Vjeç								
		Javë	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	nga 18	nga 60					
Vaksinimi			U4				U5			U6				U7			U7a/U8	U9	U10	U11/U1		J2			
Rotaviruset			G1 ^a	G2	(G3)																				
Tetanus^b			G1		G2			G3 ^c							A1		A2							A'	
Difteria^b			G1		G2			G3 ^c							A1		A2							A'	
Pertusis^b			G1		G2			G3 ^c							A1		A2							A3'	
Hib^b – Haemophilus influenzae Lloji b			G1		G2			G3 ^c																	
Poliomelilit^b			G1		G2			G3 ^c									A1								
Hepatiti B^b			G1		G2			G3 ^c																	
Pneumokok^b			G1		G2			G3 ^c																	S
IRI Meningokok B^c			G1		G2					G3 ^c															
Meningokok C										G1															
Fruthi								G1				G2													S ^e
Shytat, Rubeola								G1				G2													
Variçela								G1				G2													
HPV – Viruset Papilo Humane																	G1 ^g	G2 ^g							
Herper zoster																									G1 ^g G2 ^g
Influenca																									S (çdo vit) ^h
IRI COVID-19																									G1 ^h , G2 ^h , G3 ^h S (çdo vit) ^h

Koha e rekomanduar e vaksinimit

Periudha e kryerjes së vaksinimit për imunizimin bazë ose primar të të gjithëve akoma të pavaksinuar ose për plotësimin e një serie jo të plotë të vaksinimeve

Shpjegime

- G** Imunizimi bazë (në deri në 3 vakcina të pjesësme G1-G3)
- A** Rifreskimi i vaksinimit
- S** Vaksinimi standard

- a** Doza e parë e vaksinës nga moshë 6 javë, në varësi të vaksinës së përdorur, 2 ose 3 doza vakcine të paktën 4 javë distancë nga njëra tjetra.
- b** Foshnja të lindura para kohe: dozë shtesë e vaksinës në moshën 3 muajshe, d.m.th. 4 doza vakcine në total; foshnjat (përfshirë foshnjat e parakohshme) vaksinohen me PCV13 ose PCV15
- c** Sipas përmbledhjes së karakteristikave të produktit, seria e vaksinimit përbëhet nga 3 doza vaksinash nga moshë 2-23 muajsh dhe 2 doza vaksinash nga moshë 24 muajsh.
- d** Periudha kohore minimale nga doza e mëparshme: 6 muaj.
- e** Dy doza vaksinimi në intervale prej të paktën 5 muajsh; Një dozë e tretë është e nevojshme ndërmjet dozës së parë dhe të dytë për vaksinat e reja nga moshë ≥ 15 vjeç ose nëse interвали midis vaksinimeve ishte < 5 muaj.
- f** Vaksinimi përfurcues i Td çdo 10 vjet. Vaksinimi vijues për Td një herë si Tdap ose, nëse tregohet si vaksinim i kombinuar Tdap-IPV.

- g** Një vaksinim me një vaksinë MMR për të gjithë personat e lindur pas 1970 ≥ 18 vjet me një status të paqartë vaksinimi, pa vaksinim ose me vetëm një vaksinë në fëmijëri.
- h** Vaksinimi derisa të arrihet numri i ≥ 3 kontakteve të antigenit SARS-CoV-2 të kërkuara për imunitetin bazë (nga të cilat të paktën 1 vaksinim). Intervali minimal i vaksinimit midis G1 dhe G2 ≥ 4 deri mundësisht 12 javë, dhe midis G2 dhe G3 ≥ 6 muaj
- i** Vaksinimi me PCV20
- j** Dy vakcina me vaksinë shtesë të çaktivizuar të herpes zoster në një interval prej të paktën 2 deri në maksimum 6 muaj.
- k** Vaksinimi vijtor në vjeshtë
- *** Vaksinim mund të kryhet në disa takime vaksinimesh. MMR dhe V mund të kryhen në të njëjtën datë ose në çdo 4 javë.

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.