

Календарь прививок (стандартных) для новорожденных, детей, подростков и взрослых¹

Русский



Возраст	Нед.			Мес.							Годы							
	6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	с 18	с 60
Вакцинация от	U4			U5	U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2			
Ротавирусная инфекция	G1 ^a		G2	(G3)														
Тетанус ^b (столбняк)	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A ^e			
Дифтерия ^b	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A ^e			
Коклюш ^b (Pertussis)	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A3 ^e			
Гемофильная инфекция ^b (Haemophilus influenzae, тип b)	G1		G2		G3 ^c													
Полиомиелит ^b (детский паралич)	G1		G2		G3 ^c								A1					
Гепатит В ^b	G1		G2		G3 ^c													
Пневмококковая инфекция ^b	G1		G2		G3 ^c										S ^g			
Менингококковая инфекция типа С								G1										
Корь					G1			G2							S ^h			
Свинка, краснуха					G1			G2										
Ветряная оспа (ветрянка)					G1			G2										
ВПЧ (вирусы папилломы человека)													G1 ^d G2 ^d					
Опоясывающий герпес															G1 ^h G ^h			
Грипп															S (ежегодно)			

■ Рекомендуемый период вакцинации ■ Наверстывающий период для первичной вакцинации еще не привитых лиц или для завершения незавершенной серии прививок

Пояснения

G Первичная вакцинация (до 3 прививок G1–G3)

A Повторная вакцинация

S Стандартная вакцинация

a Первая доза вакцины уже с 6-недельного возраста, в зависимости от использованной вакцины 2 или 3 дозы с интервалом не менее 4 недель.

b Недоношенные дети; дополнительная доза вакцины в возрасте 3 месяцев, т. е. в общей сложности 4 дозы вакцины.

c Минимальный интервал между прививками: 6 месяцев.

d Две дозы вакцины с интервалом не менее 5 месяцев, при наверстывающей вакцинации, начиная с возраста

> 14 лет, или при интервале < 5 месяцев — между 1 и 2 дозами необходима третья.

e Повторная вакцина против столбняка и дифтерии (Td) каждые 10 лет. Следующая обязательная вакцинация против столбняка и дифтерии проводится однократно вакциной Tdap или, если указано, в качестве совмещенной прививки Tdap-IPV.

f Однократная вакцинация с использованием вакцины MMR для всех лиц, рожденных после 1970 года. ≥ 18 лет с неизвестной историей прививок, без прививок или с одной прививкой в детском возрасте.

g Вакцина с 23-валентным полисахаридным препаратом.

h Двукратная прививка с помощью инактивированной адьювантной вакцины от опоясывающего герпеса (герпес зостер) с интервалом от 2 до 6 месяцев максимум.

* Вакцинацию можно провести в несколько приёмов. Сделать прививку MMR и V можно за один приём либо с интервалом в 4 недели.