



Aşı	Doğum	7. hf. 1	3. ay 1	4. ay 1	5. ay 1	6. ay 1	12. ay 1	13. ay 1	15. ay 1	24. ay 1	5. yaş 1	6. yaş 1	10. yaş 1	11. yaş 1	18. yaş 1	26. yaş 1	10 yılda bir	50 yaş üstü	60 yaş üstü	
Hepatit B 3,6 ve Hepatit A 6 (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 3						HBV 3/4 3 veya HAV/HBV 6		HAV/HBV 6										
Difteri, tetanos, boğmaca 2,3,4			1. DTPa	2. 3 DTPa	3. DTPa			4. DTPa			5. DTPa o. Tdpa 4			Tdpa				Tdpa		
Hemofilus influenza Tip b 2,3			1. Hib	3	2. Hib			3. Hib												
Çocuk felci (IPV) 2,3 (üç değerli)			1. IPV	3	2. IPV			3. IPV						4. IPV				IPV		
Kızamık, kabakulak, kızamıkçık (MMR) 13							1. MMR	2. MMR					3. MMR 13							
Varisella (VZV) 5							1.VZV	2.VZV												
Meningokok B 12		Meningokok (Grup B)																		
Meningokok ACWY/C 7		Meningokok (Grup ACWY/C)																		
Influenza 8													yıllık 8							
Pnömonok		Pnömonok 9																	Pnömonok	
Rotavirüs 10		Rotavirüs																		
İnsan papilloma virüsü (HPV) 11													HPV							
Zona																			Zona	

* SIKO = Saksonya Aşı Komisyonu

Son güncelleme: 09/2022

- Zaman tanımlamaları: Örneğin: 3. ay = 3. aydan itibaren = 2. ay dolduğunda; 7. hafta = 7. haftadan itibaren = 6. hafta dolduğunda; 6 yaş = 5. yaş gününden itibaren, anlamına gelir.
- İki aşı arasında beklenen süreler. 1-3 veya 1. ve 2. aşılar arasında en az 4 hafta, temel bağışıklığı tamamlayan aşılar da 3. ve 4. veya 2. ve 3. aşılar arasında en az 6 ay.
- Bebeklik döneminde, boğmaca bileşeni içeren antijen kombinasyonlarında 3 enjeksiyon gereklidir. Normal gebelik süresinde doğan (yani gebeliğin 37. haftasından sonra doğan) bebeklerde, 6 veya 5 bileşenli aşı kullanılması halinde (uzman bilgilendirmesini dikkate alın) aşı takvimine göre 4. aya girdiklerinde (3 aylıkken) öngörülen 2. aşı yapılmayabilir (RKI'daki STIKO 2020/2021 tavsiyelerine uygun 2+1 aşılamaya şeması). Bu, 1. (3. ay) ve 2. (5. ay) aşılar arasında en az 8 haftalık bir süre ile sonuçlanır. 3. ve 4. aşılar (3+1 aşılamaya şemasında) veya 2. ve 3. aşılar (2+1 aşılamaya şemasında) arasındaki süre, en az 6 aydır.
6. yaştan itibaren aşı içeriğinde yaş sınırlandırmasına bağlı olarak azaltılan Di-Toxoid düzeyine ilişkin uzman bilgilerini dikkate alın.
- Aşılanmamış ve suçceği geçirmemiş tüm çocuklar ve gençler ile yatkınlık taşıyan tüm yetişkinlere telafi aşısı olarak.
2. yaştan itibaren HBV'ye karşı temel bağışıklık kazandırmaya bebeklikte başlanmamışsa HAV/HBV karma aşısı tavsiye edilir. Başlanmamışsa tek değerli olarak Hepatit A aşısı yapılmalıdır.
1. yaştan itibaren 2 enjeksiyon (üretici bilgilerine dikkate edin), 2. yaştan itibaren 1 enjeksiyon. Bebeklik çağındaki aşılamalarda 2. yaştan itibaren tazeleme aşısı tavsiye edilir. Aşılar, belirlenen yaş aralığına uygun olarak dört değerli konjuge aşı maddesi (Serogrup ACWY) ile yapılmalıdır.
11 yaşından itibaren 18 yaşını dolduruncaya kadar tüm çocuk ve gençler: Tazeleme aşısı veya dört değerli konjuge aşı maddesi (Serogrup ACWY) ile ilk aşılamaya.
6. ayın dolmasından itibaren.
- Standart aşılamada 24. aya kadar ilgili bağışıklık kazandırma şemasına göre konjuge aşı, 24 aylıktan itibaren sadece endikasyon aşısı tavsiye edilir.
- 2 ya da 3 doz oral aşı (üretici bilgilendirmesine dikkate edin), eş zamanlı aşılamaya için E1, sayfa 8 ve 14'e bakın (Dipnot *****).
- Tüm kız ve erkek çocuklar, kadınlar ve erkeklerde tercihen 9 değerli aşı; üreticinin aşı şemasına dikkate edin (Yaşlara göre 2 ya da 3 doz şeması).
- Üretici bilgilendirmesine göre aşı şeması. D, T, Pa, Hib, IPV, HBV, Pnömonok konjuge aşı, MMR, VZV (her defada tek değer veya karma) ile eş zamanlı aşılamaya mümkündür.
- Yaşamın 1. yılında ilk aşılamada ve dört yaşını doldurana kadar ilk ve ikinci aşılamada.