





## جدول التطعيمات لطفلك

(التطعيمات القياسية للأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق، والمراهقين والبالغين، وفقاً للجنة الدائمة للتطعيمات (STIKO))

ب - الأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق، والمراهقون والبالغون

العمر بالأعوام										
التطعيم	6-5	8-7	11-9	14-12	16-15	17	24-18	59-25	74-60	ابتداءً من عمر 75 عاماً
	الفحص الطبي 9	الفحص الطبي 10	الفحص الطبي 11	فحص الحالة الصحية للمراهقين 1		فحص الحالة الصحية للمراهقين 2				
التيتانوس	A1			A2					-A	
الدفتيريا	A1			A2					-A	
السعال الديكي	A1			A2				-A3		
شلل الأطفال				A1						
الالتهاب الكبدى الوبائى ب										
فيروس الورم الحليمى البشري (HPV)			G و G2							
المكورات السحائية من الأنواع ACWY			G1							
الحصبة								S		
التكاف والحصبة الألمانية										
جدري الماء										
المكورات الزنوية									S	
الحزام الناري (الهربس النطاقي)									G2/G1	
الإفلونزا									S (سنوياً)	
كوفيد-19									Gx	S (سنوياً)
الفيروس المخلوي التنفسي										S
المواعيد/التاريخ										

ز جرعتان من اللقاح يفارق زمني لا يقل عن 5 أشهر، وفي حالة التطعيم الاستدراكي الذي يبدأ في عمر 15 سنة فما فوق أو عند وجود فارق زمني أقل من 5 أشهر بين الجرعتين الأولى والثانية، يلزم إعطاء جرعة ثالثة

ح تطعيم التيتانوس والدفتيريا التنشيطي كل 10 سنوات. تطعيم التيتانوس والدفتيريا التالي المستحق يُعطى لمرة واحدة في شكل لقاح مدمج ضد التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي اللاخولي أو التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي اللاخولي وشلل الأطفال عند وجود دواعي الاستعمال المناسبة

ط جرعة لقاح واحدة من لقاح ضد الحصبة والتكاف والحصبة الألمانية لجميع الأشخاص المولودين بعد عام 1970 بعمر 18 سنة فما فوق ممن لديهم حالة تطعيم غير واضحة، أو لم يتلقوا التطعيم، أو تلقوا جرعة واحدة فقط في مرحلة الطفولة

ي التطعيم حتى الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق المناعة الأساسية وهو 3 مستضدات SARS-CoV-2 أو أكثر (منها جرعة لقاح واحدة على الأقل). الحد الأدنى للفارق الزمني للتطعيم بين الجرعة الأولى (G1) والجرعة الثانية (G2) هو 4 أسابيع أو أكثر ويفضل أن يصل إلى 12 أسبوعاً، وبين الجرعة الثانية (G2) والجرعة الثالثة (G3) 6 أشهر أو أكثر

ك التطعيم بلقاح PCV20

ل جرعتان من لقاح الحزام الناري الميت (الهربس النطاقي) والمعزز بفارق زمني لا يقل عن شهرين ولا يزيد عن 6 أشهر

م التطعيم السنوي في الخريف

ن تطعيم لمرة واحدة بلقاح الفيروس المخلوي التنفسي القائم على البروتين في أواخر الصيف/الخريف قبل بدء موسم الفيروس المخلوي التنفسي

\* يمكن توزيع التطعيمات على عدة مواعيد تطعيم. يمكن إعطاء لقاح الحصبة والتكاف والحصبة الألمانية ولقاح جدري الماء في نفس الموعد أو بفارق زمني مدته 4 أسابيع

\*\* جرعة لقاح واحدة بلقاح مقترن رباعي التكافؤ ضد المكورات السحائية من المجموعات المصلية A و C و W و Y لجميع الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاماً، مع إمكانية التطعيم الاستدراكي حتى سن 25 عاماً، بغض النظر عن حالة التطعيم السابقة. معهود روبرت كوخ (RKI) النشرة الوبائية 2025؛ العدد 1: 44-36

sanofi

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,  
Lützowstraße 107, 10785 Berlin

impfen.sanofi.de