

# Calendario de vacunación (vacunas sistemáticas) para bebés, niños, jóvenes y adultos<sup>1</sup>

Español



Vacuna	Edad en Semanas			Meses								Años													
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	a partir de 18	a partir de 60							
	U4			U5								U6		U7		U7a/U8		U9		U10		U11/U1		J2	
Rotavirus	G1 <sup>a</sup>		G2		(G3)																				
Tétanos <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>a</sup>							A1		A2		A <sup>i</sup>									
Difteria <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>a</sup>							A1		A2		A <sup>i</sup>									
Tosferina <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>a</sup>							A1		A2		A3 <sup>i</sup>									
Hib <sup>b</sup> – Haemophilus influenzae tipo b	G1		G2		G3 <sup>a</sup>																				
Poliomielitis <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>a</sup>							A1													
Hepatitis B <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>a</sup>																				
Neumococo <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>a</sup>													S							
<b>NUEVO</b> Meningococo B <sup>c</sup>	G1		G2				G3 <sup>a</sup>																		
Meningococo C							G1																		
Sarampión					G1				G2									S <sup>e</sup>							
Parotiditis, rubéola					G1				G2																
Varicela					G1				G2																
VPH – virus del papiloma humano													G1 <sup>a</sup> G2 <sup>a</sup>												
Herpes zóster																			G1 <sup>i</sup> G2 <sup>i</sup>						
Gripe																			S (anual) <sup>k</sup>						
<b>NUEVO</b> COVID-19																			G1 <sup>b</sup> , G2 <sup>b</sup> , G3 <sup>b</sup> S (anual) <sup>k</sup>						

■ Edad de vacunación recomendada

■ Período de administración de dosis de recuerdo para la inmunización básica o primoinmunización de todos los aún no vacunados o para completar una serie de vacunación incompleta

**Legenda**

**G** Inmunización básica (en hasta 3 administraciones parciales G1–G3)

**A** Vacunación de refuerzo

**S** Vacunación estándar

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

**a** Primera dosis a partir de las 6 semanas de vida, 2 o 3 dosis en función de la sustancia a intervalos de al menos 4 semanas

**b** Bebés prematuros: dosis adicional a los 3 meses de vida, es decir, 4 dosis en total; los bebés (incluidos los prematuros) se vacunan con PCV13 o PCV15.

**c** Según la información técnica, la serie de vacunación consta de 3 dosis de vacuna desde los 2 a los 23 meses y 2 dosis de vacuna a partir de los 24 meses

**d** Tiempo de espera mínimo respecto a la dosis anterior: 6 meses

**e** Dos dosis con un tiempo de espera mínimo entre ellas de 5 meses; para la dosis de recuerdo, empezando con  $\geq 15$  años o con un tiempo de espera entre dosis de  $< 5$  meses, es necesaria una 3.<sup>a</sup> dosis entre la 1.<sup>a</sup> y la 2.<sup>a</sup>.

**f** Administración de refuerzo de Td cada 10 años. La próxima vacuna Td necesaria, una vez como dosis DTPa o, con la indicación correspondiente, como vacuna combinada DTPa-VPI.

**g** Dosis única con una vacuna SRP (triple vírica) para todas las personas nacidas después de 1970 de  $\geq 18$  años con un estado de vacunación incierto, no vacunadas o con una sola vacunación en la niñez

**h** Vacunación hasta alcanzar el número de  $\geq 3$  contactos con el antígeno del SARS-CoV-2 necesarios para la inmunidad básica (de los cuales al menos 1 vacunación). Intervalo mínimo de vacunación entre G1 y G2  $\geq 4$  a preferiblemente 12 semanas, y entre G2 y G3  $\geq 6$  meses

**i** Vacunación con PCV20

**j** Vacuna de dos dosis con la vacuna inactivada adyuvante contra el herpes zóster con un tiempo entre dosis de 2 meses como mínimo y de 6 meses como máximo

**k** Vacunación anual en otoño

**\*** Las vacunas se pueden repartir entre varias visitas. La SRP y la SRPV se pueden administrar en la misma visita o con un intervalo de 4 semanas.

MAT-DE-2400751-V1.0-02/2024