

Kalendari i vaksinimit (vaksinat standarde) për foshnja, fëmijë, adoleshentë dhe të rritur¹

Shqip



Vaksinimi për	Mosha në				Muaj							Vjeç							
	Javë	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	nga 18	nga 60
			U4		U5	U6					U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotavirusi		G1 ^a	G2	(G3)															
Tetanus ^b (Tetanozi)		G1		G2		G3 ^c							A1		A2				A ^e
Difteria ^b		G1		G2		G3 ^c							A1		A2				A ^e
Pertusis ^b (Kolla e mirë)		G1		G2		G3 ^c							A1		A2				A3 ^e
Hib ^b (<i>Haemophilus influenzae</i> Lloji b)		G1		G2		G3 ^c													
Poliomeliti ^b (Paraliza e fëmijëve)		G1		G2		G3 ^c									A1				
Hepatiti B ^b		G1		G2		G3 ^c													
Pneumokok ^b		G1		G2		G3 ^c													S ^g
Meningokok C								G1											
Fruthi							G1			G2									S ^h
Shytat, Rubeola							G1			G2									
Variçela (Lija e dhenve)							G1			G2									
HPV (Viruset Papilo Humane)															G1 ^d G2 ^d				
Herper zoster																			G1 ^h G ^h
Influenca (Gripi)																			S <small>[çdo vit]</small>

■ Koha e rekomanduar e vaksinimit ■ Periudha e kryerjes së vaksinimit për imunizimin bazë ose primar të të gjithëve akoma të pavaksinuar ose për plotësimin e një serie jo të plotë të vaksinimeve

Shpjegime

G Imunizimi bazë (në deri në 3 vakcina të pjesshme G1–G3)

A Rifreskimi i vaksinimit

S Vaksinimi standard

- a** Doza e parë e vaksinës nga mosha 6 javë, në varësi të vaksinës së përdorur, 2 ose 3 doza vakcine të paktën 4 javë distancë nga njëra tjetra.
b Foshnja të lindura para kohe: dozë shtesë e vaksinës në moshën 3 muajshe, d.m.th. 4 doza vakcine në total.
c Periudha kohore minimale nga doza e mëparshme: 6 muaj.
d Dy doza vaksinash të paktën 5 muaj distancë nga njëra tjetra, me vaksinimin plotësues që fillon në moshën > 14

vjeç ose me intervale vaksinimi < 5 muaj midis 1. dhe 2. Dozimi një 3. Kërkohej doza.

e Vaksinimi përfurcues i Td çdo 10 vjet. Vaksinimi vijues për Td një herë si Tdap ose, nëse tregohet si vaksinim i kombinuar Tdap-IPV.

f Një vaksinim me një vaksinë MMR për të gjithë personat e lindur pas 1970 ≥ 18 vjet me një status të paqartë vaksinimi, pa vaksinim ose me vetëm një vaksinë në fëmijëri.

g Vaksinimi me vaksinën 23-valent polisakaride.

h Dy vakcina me vaksinën shtesë të çaktivizuar të herpes zoster në një interval prej të paktën 2 deri në maksimum 6 muaj.

* Vaksinat mund të kryhen në disa takime vaksinimesh. MMR dhe V mund të kryhen në të njëjtën datë ose në çdo 4 javë.