

Calendrier des vaccinations (vaccinations standard) pour nourrissons, enfants, adolescents et adultes¹

Français



Vaccination	semaines				mois							ans							
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	à partir de 18	à partir de 60	
Rotavirus	U4		G2	(G3)															
Tétanus ^b	G1		G2		G3 ^c							A1		A2		A1			
Diphthérie ^b	G1		G2		G3 ^c							A1		A2		A1			
Pertussis ^b	G1		G2		G3 ^c							A1		A2		A3 ^c			
Hib ^b – Haemophilus influenzae Type b	G1		G2		G3 ^c														
Poliomyélite ^b	G1		G2		G3 ^c							A1							
Hépatite B ^b	G1		G2		G3 ^c														
Pneumocoques ^b	G1		G2		G3 ^c							S							
Méningocoques B ^b	G1		G2					G3 ^c											
Méningocoques C								G1											
Rougeole					G1			G2		S ^c									
Oreillons, rubéole					G1			G2											
Varicella					G1			G2											
HPV – Papillomavirus humain															G1 ^c G2 ^c				
Herpès zoster																		G1 ^c G2 ^c	
Influenza																		S (annual) ^k	
COVID-19																G1 ^b , G2 ^b , G3 ^b		S (annual) ^k	

■ Période de vaccination recommandée

■ Période de rattrapage des vaccinations de base, ou première immunisation de personnes non vaccinées, ou en complément d'une vaccination non achevée

Explications

G Immunisation de base (jusqu'à 3 vaccinations partielles G1-G3)

A Vaccin de rappel

S Vaccin standard

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

a Première dose de vaccin dès l'âge de 6 ans, selon le vaccin utilisé, 2 ou 3 injections, à des intervalles de 4 semaines au moins.

b Prématurés : une dose de vaccin supplémentaire à l'âge de 3 mois, soit au total 4 doses de vaccin; les prématurés (y compris les bébés prématurés) sont vaccinés avec le PCV13 ou le PCV15

c Selon l'information professionnelle, la série de vaccination comprend 3 doses de vaccin à partir de 2 ans - 23 mois et 2 doses de vaccin à partir de 24 mois.

d Intervalle entre les doses : 6 mois.

e Deux doses de vaccin à des intervalles de 5 mois au moins pour les rattrapages de vaccination qui commencent à un âge \geq 15 ans ou pour des intervalles de vaccination < 5 mois, une troisième dose est nécessaire entre la première et la deuxième.

f Vaccin Td de rappel tous les 10 ans. Prochaine vaccination Td unique comme vaccin DTaP ou en cas d'indication correspondante comme vaccin combiné DTaP-IPV.

g Vaccination unique avec un vaccin ROR pour toutes les personnes \geq 18 ans nées après 1970 avec un état vaccinal incertain, sans vaccination ou avec une seule vaccination dans l'enfance.

h Vaccination jusqu'à ce que le nombre de \geq 3 contacts avec l'antigène du SRAS-CoV-2 requis pour l'immunité de base (dont au moins 1 vaccination) soit atteint. Intervalle minimum de vaccination entre G1 et G2 \geq 4, de préférence 12 semaines, et entre G2 et G3 \geq 6 mois

i Vaccination avec le PCV20

j Vaccination en deux étapes avec le vaccin avec adjuvant contre l'herpès zoster à des intervalles minimaux de 2 à 6 mois max.

k Vaccination annuelle en automne

* Les différentes vaccinations peuvent être réparties sur plusieurs dates de vaccination. ROR et V peuvent être administrés à la même date ou à des intervalles de 4 semaines.

MAT-DE-2400751-V1.0-02/2024