

Calendarul vaccinării 2026

(Imunizări standard cu vaccinuri și anticorpi monoclonali [AcM])



A – Sugari și copii mici < 5 ani (0–59 luni)														
Vaccinare/ imunizare	Vârsta în săptămâni			Vârsta în luni										
	0	4	6	2	3	4	5–6	7–10	11*	12	13–14	15	16–23	24–59
	U2	U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8
Virusuri sincițiale respiratorii	AcM (doză unică) în funcție de luna nașterii ^a													
Rotavirusuri		G1 ^b		G2	(G3)									
Tetanos^c				G1		G2			G3 ^f					
Difterie^c				G1		G2			G3 ^f					
Pertussis (tuse convulsivă)^c				G1		G2			G3 ^f					
Hib^b H. influenzae tip b				G1		G2			G3 ^f					
Poliomielită^c				G1		G2			G3 ^f					
Hepatitis B^c				G1		G2			G3 ^f					
Pneumococi^{c,d}				G1		G2			G3 ^f					
Meningococi B^e				G1		G2				G3 ^f				
Rujeolă, oreion, rubeolă									G1			G2		
Varicelă									G1			G2		
Termene/date														

- Momentul recomandat pentru vaccinare
- Perioada recomandată pentru administrarea AcM
- Perioada pentru vaccinarea de recuperare în cazul imunizării de bază sau inițiale și administrarea AcM

- G Imunizare de bază (G1–G3)
- A Rapel
- S Vaccinare standard
- AcM anticorpi monoclonali

- a Copiii născuți între aprilie și septembrie trebuie să li se administreze Nirsevimab în toamnă, înainte de începerea primului lor sezon de VSR; nou-născuților de orice vârstă gestațională care se nasc în timpul sezonului de VSR (de obicei între octombrie și martie), trebuie să li se administreze Nirsevimab cât mai repede posibil după naștere, ideal la externarea din maternitate sau la controlul U2 (în zilele 3 – 10 de viață).
- b Prima doză de vaccin se administrează încă de la vârsta de 6 săptămâni; în funcție de vaccinul utilizat, se administrează 2 sau 3 doze de vaccin la un interval de cel puțin 4 săptămâni
- c Copiii născuți prematur: o doză suplimentară de vaccin la vârsta de 3 luni, adică un total de 4 doze de vaccin
- d Sugarii (inclusiv cei născuți prematur) se vaccinează cu PCV13 sau PCV15
- e Conform informațiilor de specialitate, schema de vaccinare cuprinde 3 doze de vaccin la vârsta de 2 – 23 luni și 2 doze de vaccin începând cu vârsta de 24 de luni
- f Intervalul minim față de doza anterioară de vaccin: 6 luni

Adaptat după: Recomandările Comisiei Permanente pentru Vaccinare (STIKO) din cadrul Institutului Robert Koch. Buletin epidemiologic 4/2026

impfen.sanofi.de

sanofi

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Lützowstraße 107, 10785 Berlin

Calendarul vaccinării pentru copilul dumneavoastră

(Vaccinări de rutină pentru copiii cu vârsta de peste 5 ani, adolescenți și adulți, conform STIKO¹)



B – Copii cu vârsta de ≥ 5 ani, adolescenți și adulți										
Vaccinare	Vârsta în ani									
	5–6	7–8	9–11	12–14	15–16	17	18–24	25–59	60–74	peste 75
	U9	U10	U11	J1		J2				
Tetanos	A1				A2				A ^b	
Difterie	A1				A2				A ^b	
Pertussis (tuse convulsivă)	A1				A2			A3 ^b		
Poliomielită					A1					
Hepatită B										
HPV – Papilomavirus uman				G ⁹ și G2 ⁹						
Meningococi ACWY				G1**						
Rujeolă								S ⁱ		
Oreion, rubeolă										
Varicelă										
Pneumococi										S ^x
Herpes zoster										G1 ⁱ /G2 ⁱ
Gripă										S (anual) ^m
COVID-19								Gx ⁱ		S (anual) ^m
Virusuri sincițiale respiratorii										S ⁿ
Termene/date										

- g** Două doze de vaccin la un interval de cel puțin 5 luni; în cazul vaccinării de recuperare începând de la vârsta de ≥ 15 ani sau în cazul unui interval de vaccinare < 5 luni între prima și a doua doză de vaccin, este necesară o a 3-a doză de vaccin
- h** Rapel Td o dată la 10 ani. Următoarea vaccinare Td necesară: 1 singură doză de vaccin Tdap sau, dacă este indicat, vaccinul combinat Tdap-IPV
- i** O doză de vaccin ROR pentru toate persoanele născute după 1970, cu vârsta de cel puțin 18 ani, al căror statut vaccinal este necunoscut, care nu au fost vaccinate sau cărora li s-a administrat o singură doză de vaccin în copilărie
- j** Vaccinarea se continuă până când se atinge numărul de ≥ 3 contacte cu antigenul SARS-CoV-2 necesare pentru imunitatea de bază (dintre care cel puțin 1 vaccinare). Intervalul minim între vaccinarea G1 și G2 este de ≥ 4 până la, de preferință, 12 săptămâni, iar între G2 și G3 este de ≥ 6 luni
- k** Vaccinare cu PCV20
- impfen.sanofi.de**

- l** 2 doze de vaccin inactivat cu adjuvant împotriva herpesului zoster, administrate la un interval de cel puțin 2 și cel mult 6 luni
- m** Vaccinare anuală de toamnă
- n** 1 singură doză de vaccin împotriva VSR pe bază de proteine, administrată la sfârșitul verii/toamna, înainte de începerea sezonului de VSR
- *** Vaccinările pot fi administrate în cadrul mai multor programări. Vaccinul ROR și vaccinul V pot fi administrate în aceeași zi sau la un interval de 4 săptămâni
- **** O doză de vaccin conjugat tetravalent împotriva meningococilor din serogrupurile A, C, W și Y pentru toți copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, cu posibilitatea recuperării vaccinării până la vârsta de 25 de ani, indiferent de statutul de vaccinare. Institutul Robert Koch (RKI) Buletin epidemiologic 2025; 44:1-36

sanofi

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Lützowstraße 107, 10785 Berlin