

Ημερολόγιο εμβολιασμού (τυποποιημένοι εμβολιασμοί) για βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενήλικες ¹

Γερμανικά



Ηλικία σε	Εβδομάδες			Μήνες							Έτη									
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	από 18	από 60		
Εμβόλιο κατά	U4			U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2					
Ροταϊόι	G1 ^a		G2	(G3)																
Τέτανος ^b	G1		G2		G3 ^c														A ^e	
Διφθερίδα ^b	G1		G2		G3 ^c														A ^e	
Κοκκύτης ^b	G1		G2		G3 ^c														A ^e	
Hib ^b (H. influenzae- Αιμόφιλος της γρίπης τύπου β)	G1		G2		G3 ^c															
Πολιομυελίτιδα ^b	G1		G2		G3 ^c														A1	
Ηπατίτιδα B ^b	G1		G2		G3 ^c															
Πνευμονιόκοκκοι ^b	G1		G2		G3 ^c														S ^g	
Μηνιγγιτιδόκοκκοι C																		G1		
Ιλαρά																		G1	G2	S ⁱ
Παρρωτίτιδα, ερυθρά																		G1	G2	
Ανεμοβλογιά																		G1	G2	
HPV (Ιαί των ανθρωπίνων θηλωμάτων)																		G1 ^d G2 ^d		
Έρπηθς ζωστήρας																		G1 ^h G ^h		
Influenza (γρίπη)																		S (επιδόση)		

■ Συνιστάμενος χρόνος εμβολιασμού ● Χρονικό διάστημα μετέπειτα εμβολιασμού για βασική ή πρώτη ανοσοποίηση όλων όσων δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί ή για την ολοκλήρωση μιας ατελούς σειράς εμβολιασμών

Επεξηγήσεις

G Βασική ανοσοποίηση (σε έως 3 μερικούς εμβολιασμούς G1-G3)

A Επανάληπτος εμβολιασμός

S Καθιερωμένος εμβολιασμός

a Πρώτη δόση εμβολίου από την ηλικία των 6 εβδομάδων, ανάλογα με το εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε, 2 ή 3 δόσεις εμβολίου σε διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.

b Πρόωρα βρέφη: πρόσθετη δόση εμβολίου σε ηλικία 3 μηνών, δηλαδή, 4 δόσεις εμβολίου συνολικά.

c Ελάχιστο διάστημα από την προηγούμενη δόση: 6 μήνες.

d Δύο δόσεις εμβολίου με χρονική απόσταση τουλάχιστον 5 μηνών, στον εμβολιασμό που ξεκινά από την ηλικία >14 ετών ή με χρονική απόσταση εμβολιασμού <5 μηνών μεταξύ της 1ης και της 2ης δόσης απαιτείται μια 3η δόση.

e Αναμνηστικός εμβολιασμός Td (τέτανου - διφθερίδας) κάθε 10 χρόνια. Ο επόμενος εμβολιασμός Td (τέτανου - διφθερίδας) εφάπαξ ως Tdap (διφθερίδας, τέτανου, κοκκύτη) ή/και αναφέρεται ως συνδυασμός εμβολιασμού Tdap-IPV.

f Εφάπαξ εμβολιασμός με εμβόλιο MMR για όλα τα άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1970 ≥ 18 ετών με ασαφή κατάσταση εμβολιασμού, χωρίς εμβολιασμό ή με μόνο έναν εμβολιασμό κατά την παιδική ηλικία.

g Εμβολιασμός με το 23-πλο εμβόλιο πολυσακχαρίτη.

h Εμβολιασμός δύο φορές με το ανοσοενισχυμένο εμβόλιο έρπηθς ζωστήρας σε διάστημα τουλάχιστον 2 έως το πολύ 6 μηνών.

* Οι εμβολιασμοί μπορούν να καταμεληθούν σε πολλά ραντεβού εμβολιασμού. Τα MMR και V μπορούν να δοθούν κατά το ίδιο ραντεβού ή σε διαστήματα 4 εβδομάδων.