

# الجدول الزمني للتطعيمات (القياسية) المعطاة للرضع والأطفال الصغار والبالغين<sup>1</sup>

العربية



السنوات								الشهور								الأسابيع	العمر بعدد	التطعيم ضد		
60 من	18 من	17	16-15	14-9	8-7	6-5	4-2	23-16	15	14-13	12	*11	10-5	4	3	2	6			
		J2		J1/U11	U10	U9	U8/U7a	U7				U6	U5	U4						
																				التطعيم ضد
																				الفيروسات العجلية
																				التيتانوس- (الكزاز)
																				الدفتريا
																				الشاهوق- (السعال الديكي)
																				المستعمية النزلية- (النزلة النزفية من النوع ب)
																				التهاب سنجابية النخاع- (ثلاث الأطفال)
																				التهاب الكبد ب-
																				المكورات الرئوية-
																				المكورات السحائية سي
																				الحصبة
																				التكاف، والحصبة الألمانية
																				جدري الماء (الحماق)
																				فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
																				الهربس النطاقي
																				الإفلونزا (الزكام)

● موعد التطعيم الموصى به □ الفترة الزمنية لاستكمال التطعيم للتحصين الأساسي أو الأول لكل من لم يتم تطعيمهم أو لإكمال سلسلة تطعيم غير مكتملة

- د جرعا تطعيم بينهما مسافة زمنية فاصلة قدرها 5 أشهر، وفي حالة التطعيم الاستراكي يبدأ بين < 14 سنة أو في حالة فاصل تطعيم زمني قدره > 5 أشهر، تكون هناك ضرورة لجرعة ثالثة بين الجرعتين الأولى والثانية.
- ح التطعيم المُجدد للتيتانوس والدفتريا كل 10 سنوات. تطعيم التيتانوس والدفتريا المستحق تالياً مرة في شكل تطعيم للتيتانوس والدفتريا والسعال الديكي أو في حالة وجود مؤشر ذي صلة في شكل تطعيم مرئج للتيتانوس والدفتريا والسعال الديكي مع لقاح مُعطل لثلاث الأطفال.
- ف تطعيم لمرءة واحدة مع لقاح الحصبة والتكاف والحصبة الألمانية لكل من زُلدا بعد عام 1970 ≤ 18 سنة مع حالة تطعيم مجهولة أو دون تطعيم أو مع تطعيم واحد آخر في الطفولة
- و تطعيم باستخدام لقاح العنقبات الرئوية عند السكريد ذي التكافؤ 23.
- ه تطعيم لمرئتين باستخدام لقاح الهربس النطاقي المُكتمل غير النشط على مسافة زمنية قدرها من 2 إلى 6 أشهر بحد أقصى.
- \* يمكن توزيع التطعيمات على مواعيد تطعيم مُعددة. للقاح ضد الحصبة والتكاف والحصبة الألمانية ولقاح جدري الماء يمكن حقنهما في الموعد نفسه أو على مسافة زمنية قدرها 4 أسابيع.

الشرح  
**حرف G** تحصين أساسي (فيما يصل إلى 3 تطعيمات جزئية G1-G3)  
**حرف A** تطعيم مُجدد  
**حرف S** تطعيم قبائي

- أ جرعة التطعيم الأولى بدأ بين 6 أسابيع، حسب اللقاح المُستخدم 2 إلى 3 جرعات من اللقاح على مسافة زمنية متباعدة أداها 4 أسابيع.
- ب المولودون قبل الأوان: جرعة تطعيم إضافية في عمر 3 أشهر، أي 4 جرعات تطعيم في المجمال.
- ج المسافة الزمنية الدنيا الفاصلة عن الجرعة السابقة: 6 أشهر.