



Cjepivo	Rođenje	7. tj. ¹	3. mj. ¹	4. mj. ¹	5. mj. ¹	6. mj. ¹	12. mj. ¹	13. mj. ¹	15. mj. ¹	24. mj. ¹	5. god. života ¹	6. god. života ¹	10. god. života ¹	11. god. života ¹	18. god. života ¹	26. god. života ¹	svakih 10 g.	preko 50 g.	preko 60 g.		
Hepatitis B ^{3,6} i hepatitis A ⁶ (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 ³					HBV 3/4 ³ ili HAV/HBV ⁶			HAV/HBV ⁶											
Difterija, tetanus, hripavac ^{2,3,4}		1. DTPa	2. ³ DTPa	3. DTPa						4. DTPa	5. DTPa o. Tdpa ⁴		Tdpa		Tdpa						
Haemophilus influenzae Tip b ^{2,3}		1. Hib	3		2. Hib						3. Hib										
Dječja paraliza (IPV) ^{2,3} (trovalentno)		1. IPV	3		2. IPV						3. IPV		4. IPV		IPV						
Ospice, zaušnjaci, rubeola (MPR) ¹³							1. MMR	2. MMR							3. MMR ¹³						
Varičele (VZV) ⁵							1.VZV	2.VZV													
Meningokoki B ¹²		Meningokoki (skupina B)																			
Meningokoki ACWY/C ⁷		Meningokoki (skupine ACWY/C)																			
Gripa ⁸												godišnje ⁸									
Pneumokoki		Rotavirusi					Pneumokoki ⁹										Pneumokoki				
Rotavirusi ¹⁰		Rotavirusi																			
Humani papilomavirus (HPV) ¹¹												HPV									
Herpes zoster																	Herpes zoster				

* SIKO = Sächsische Impfkommision (Odbor za cijepljenje Slobodne države Saske)

Stanje: 09/2022

- Definicija oznaka vremena: znači npr.: 3. mj. = od 3. mjeseca = navršenog 2. mjeseca; 7. tjedan = od 7. tjedna = navršenog 6. tjedna; 6. god. života = od 5. rođendana.
- Vremenski razmaci između cijepljenja 1–3. odn. 1 i 2 najmanje 4 tjedna, između 3 i 4. odn. 2. i 3. cjepljiva kao dopunjavanje osnovne imunološke otpornosti najmanje 6 mjeseci.
- U slučaju kombinacije inaktivnih cjepiva potrebne su 3 injekcije u dojenčjoj dobi. **Kod dojenčadi rođene unutar termina (odn. nakon napunjenog 37. tjedna trudnoće) kod primjene šesterovalentnih ili peterovalentnih cjepiva (imajte na umu stručne informacije) može otpasti 2. doza cjepiva koja je prema kalendaru cijepljenja predviđena u 4. mjesecu života, odn. u dobi od 3 mjeseca života (shema cijepljenja 2+1 u skladu s preporukama za 2020./2021. Stalne komisije za cijepljenja (STIKO) Instituta Robert Koch). Odatle proizilazi razmak od najmanje 8 tjedana između 1. cjepljenja (3. mjesec života) i 2. cjepljenja (5. mjesec života). Razmak između cjepiva 3 i 4 (kod sheme cijepljenja 3+1) odn. 2 i 3 (kod sheme cijepljenja 2+1) iznosi najmanje 6 mjeseci.**
- Od 6. god. života – imajte na umu stručne informacije o cjepivima u vezi sa starišnim ograničenjem s obzirom na reducirani sadržaj di-toksoida.
- Sva necijepljena djeca / adolescenti s negativnom anamnezom varičele i sve toj bolesti podložne odrasle osobe kao nadoknadno cjepivo.
- Od 2. god. života – u slučaju da se s osnovnom imunizacijom cjepivom protiv HBV-a nije započelo u dojenčjoj dobi, preporučuje se kombinirano cjepivo HAV/HBV. Ako se s imunizacijom započelo pravovremeno, onda je potrebno cijepiti monovalentno protiv hepatitisa A.
- U 1. god. života 2. injekcije (obratite pozornost na navode proizvođača), od 2. god. života 1. injekcija. Prilikom cijepljenja dojenčadi preporučuje se revakcinacija od 2. godine života. Cijepiti je potrebno tetravalentnim konjugiranim cjepivom (serološke skupine ACWY) u skladu s odobrenjima za specifičnu dob. Sva djeca i mladi od 11. godine života do navršene 18. godine života: docijepljivanje ili prvo cijepljenje tetravalentnim konjugiranim cjepivom (serološke skupine ACWY).
- Od navršene 6. mjeseca života.
- Standardno cjepivo se do 24. mjeseca života preporučuje konjugiranim cjepivom ovisno o pojedinoj shemi imunizacije, kod djece nakon 24. mjeseca života preporučuju se samo cjepiva nakon utvrđivanja indikacije.
- Oralno cijepljenje s 2 ili 3 doze (obratite pozornost na navode proizvođača), za simultano cijepljenje pogledajte E1, str. 8 i 14 (bilješka*****)
- Sve djevojčice i žene, svi dječaci i muškarci preporučeno devetovaleantnim cjepivom; obratite pozornost na shemu cijepljenja proizvođača (shema s 2 ili 3 doze, ovisno o dobi cjepljenika).
- Shema cijepljenja po navodima proizvođača, moguće je simultano cijepljenje protiv D, T, Pa, Hib, IPV, HBV, konjugirano cjepivo protiv pneumokoka, MPR, VZV (svako od njih monovalentno ili u kombinaciji).
- Za prvo cijepljenje u 1. godini života, kao i za prvo i drugo cijepljenje do napunjene četvrtine godine života.