

Kalendar vakcinacije za decu, adolescente i odrasle u Slobodnoj Državi Saksoniji. (status 01.01.2024)



Vakcini [#]	Postnatalno	6 nedelja	2 mjeseca	3 mjeseca	4 mjeseca	6 mjeseca	11 mjeseca	12 mjeseca (1 godina)	14 mjeseca	23 mjeseca	4 godine	5 godine	9 godine	10 godine	25 godine	≥ 50 godine	≥ 60 godine	svakih 10 godina
Hepatitis B Hepatitis A (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 (interval > 4 nedelje)						HBV 3/4 Ili HAV 1 ► HAV 2 (interval 6–12 mjeseca) Ili HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (interval > 4 nedelje) ► HAV/HBV 3 (6–12 mjeseca)										
Difterije, tetanusa pertusisa *		DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3				DTPa 4			DTPa 5		Tdap					Tdap
<i>Haemophilus influenzae</i> tipa b *		Hib 1	*	Hib 2				Hib 3										
Poliomijelitisa (IPV) * (trovalentno)		IPV 1	*	IPV 2				IPV 3				IPV 4						IPV
Morbila, zauški rubeola							MMR 1	MMR 2			MMR 3 [‡]							
Varičela							VZV 1	VZV 2										
Meningokokne bolesti B		Meningokokne bolesti (grupa B)																
Meningokokne bolesti ACWY/C		Meningokokne bolesti (grupe ACWY/C)																
Influence								Influence godišnje										
COVID-19 **																		COVID-19
Pneumokokne bolesti ***		PCV 1 ► PCV 2 (interval > 2 mjeseca), PCV 3 (interval > 7 mjeseca)											Pneumokokne bolesti					
Rotavirusa		Rotavirusa																
Humanih papiloma virusa (HPV) ***													≤ 14 g HPV1 ► HPV 2	≥ 15 g HPV1 ► HPV2 ► HPV3				
Herpesa zoster													RZV 1 ► RZV 2 (interval >6 mjeseca)					

Od suštinskog je značaja posmatrati rezime karakteristika proizvoda za odgovarajuće vakcine i sledeće tabele sa informacijama o aplikativima i intervalima vakcinacija! * Sve osobe koje su podložne (pogledajte tabele ispod) * Za antigene kombinacije koje sadrže komponentu pertusis, potrebne su tri injekcije u povodu; Kod odočadi sa punim radnim vremenom, druga vakcinacija planirana sa 3 meseca starosti može se izostaviti kada se koriste vakcine od 6 ili 5 puta (takozvani 2 + 1 raspored). ** Godišnji sezonski pojačivač vakcinom prilagođenom varijantama virusa (COVID-19) ili soju (influence) *** Sledeće vakcine se preporučuju kao preferencija: pneumokoka (od 18. godine); 20-valentna konjugacija vakcine (PCV20), HPV; 9-valentna vakcina; herpesa zoster: rekombinantna, adjuvanted vaccine (RZV)