

# Kalendar cijepjenja 2026.

(standardne imunizacije cjepivima i monoklonskim antitijelima [mAk])



A – Dojenčad i mala djeca < 5 godina (0 – 59 mjeseci)														
Cijepjenje/ imunizacija	Dob u tjednima			Dob u mjesecima										
	0	4	6	2	3	4	5 – 6	7 – 10	11*	12	13 – 14	15	16 – 23	24 – 59
	U2	U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8
Respiratorni sincicijski virusi	mAk (jednokratna doza) ovisno o mjesecu rođenja <sup>a</sup>													
Rotavirusi		G1 <sup>b</sup>		G2	(G3)									
Tetanus <sup>c</sup>				G1		G2			G3 <sup>f</sup>					
Difterija <sup>c</sup>				G1		G2			G3 <sup>f</sup>					
Hripavac <sup>c</sup>				G1		G2			G3 <sup>f</sup>					
Hib <sup>b</sup> <i>H. influenzae</i> tip b				G1		G2			G3 <sup>f</sup>					
Poliomijelitis <sup>c</sup>				G1		G2			G3 <sup>f</sup>					
Hepatitis B <sup>c</sup>				G1		G2			G3 <sup>f</sup>					
Pneumokok <sup>c, d</sup>				G1		G2			G3 <sup>f</sup>					
Meningokok B <sup>e</sup>				G1		G2				G3 <sup>f</sup>				
Ospice, zaušnjaci, rubeola									G1				G2	
Vodne kozice									G1				G2	
Termini/datum														

- Preporučeno vrijeme cijepjenja
- Preporučeno razdoblje za primjenu mAk-a
- Naknadno razdoblje cijepjenja za osnovnu odnosno prvu imunizaciju i primjenu mAk-a

- G Osnovna imunizacija (G1 – G3)
- A Dodatno cijepjenje
- S Standardno cijepjenje
- mAk Monoklonska antitijela

Modificirani prema preporukama njemačkog Stalnog povjerenstva za cijepjenje (STIKO) na Institutu Robert Koch. Epi-Bull 4/2026

- a Djeca rođena između travnja i rujna moraju primiti nirsevimab na jesen prije početka prve sezone RSV-a; novorođenčad svake gestacijske dobi koja će se roditi tijekom sezone RSV-a (uglavnom između listopada i ožujka) mora primiti nirsevimab što prije nakon rođenja, idealno nakon otpusta iz rodilišta, odnosno pri U2 (3. – 10. dan života).
- b Prva doza cijepjenja već od 6. tjedna života, ovisno o cjepivu 2 do 3 doze cjepiva u razmaku od najmanje 4 tjedna
- c Nedonoščad: dodatne doze cjepiva u dobi od 3 mjeseca, što znači ukupno 4 doze cjepiva
- d Dojenčad (uključujući nedonoščad) cijepit će se cjepivom PCV13 ili PCV15
- e Prema stručnim informacijama serija cijepjenja u dobi od 2 do 23 mjeseca sastoji se od 3 doze cjepiva, od dobi od 24 mjeseca od 2 doze cjepiva
- f Minimalni razmak od prethodne doze cjepiva: 6 mjeseci

# Kalendar cijepljenja za vaše dijete

(standardna cjepiva za djecu od 5 godina, mlade i odrasle, prema STIKO-u<sup>1</sup>)



B – Djeca ≥ 5 godina, mladi i odrasli										
Cijepljenje	Dob u godinama									
	5 – 6	7 – 8	9 – 11	12 – 14	15 – 16	17	18 – 24	25 – 59	60 – 74	od 75
	U9	U10	U11	J1		J2				
Tetanus	A1			A2				A <sup>h</sup>		
Difterija	A1			A2				A <sup>h</sup>		
Hripavac	A1			A2			A3 <sup>h</sup>			
Poliomijelitis				A1						
Hepatitis B										
HPV – humani papiloma virusi				G <sup>o</sup> i G2 <sup>o</sup>						
Meningokok ACWY				G1**						
Ospice							S <sup>i</sup>			
Zaušnjaci, rubeola										
Vodne kozice										
Pneumokok									S <sup>x</sup>	
Herpes zoster									G1/G2 <sup>i</sup>	
Gripa									S (godišnje) <sup>m</sup>	
COVID-19							Gx <sup>i</sup>		S (godišnje) <sup>m</sup>	
Respiratorni sincicijski virusi										S <sup>n</sup>
Termini/datum										

- g** Dvije doze cjepiva u razmaku od najmanje 5 mjeseci, pri naknadnom cijepljenju s početkom od dobi ≥ 15 godina ili razmaku cijepljenja < 5 mjeseci između 1. i 2. doze cjepiva potrebna je 3. doza cjepiva
- h** Dodatno cijepljenje Td svakih 10 godina. Sljedeće cijepljenje Td jednokratno kao Tdap, odnosno pri odgovarajućoj indikaciji kao kombinirano cijepljenje Tdap-IPV
- i** Jedna doza cjepiva MMR za sve osobe rođene nakon 1970., ≥ 18 godina i s nejasnim statusom cijepljenja, necijepljene ili sa samom jednim cjevivom u djetinjstvu
- j** Cijepljenje dok se ne postigne ≥ 3 kontakta s antigenom SARS-CoV-2 koji su potrebni za osnovni imunitet (od čega najmanje 1 cijepljenje). Minimalni razmak između G1 i G2 ≥ 4, po mogućnosti 12 tjedana i između G2 i G3 ≥ 6 mjeseci
- k** Cjepivo PCV20

- l** 2 doze adjuvantiranog cjepiva protiv herpes zosteru u razmaku od najmanje 2 do maksimalno 6 mjeseci

**m** Godišnje cijepljenje na jesen

**n** Jednokratno cijepljenje cjevivom protiv RSV-a baziranom na proteinima krajem ljeta / na jesen prije početka sezone RSV-a

\* Cjepiva se mogu podijeliti na više termina cijepljenja. MMR i V mogu se dati u istom terminu ili s razmakom od 4 tjedna

\*\* Jedna doza cjepiva četverovalentnim konjugiranim cjevivom protiv meningokoka serogrupe A, C, W i Y za svu djecu i mlade u dobi od 12 do 14 godina, s naknadnim cijepljenjem za osobe do 25 godina, neovisno o statusu cijepljenja. Institut Robert Koch (RKI) Epid Bull 2025; 44:1 – 36