

# Calendrier vaccinal 2026

(Immunisations de routine par vaccins et anticorps monoclonaux [Acm])



A – Nourrissons et jeunes enfants < 5 ans (0 à 59 mois)														
Vaccination/ immunisation	Âge en semaines			Âge en mois										
	0	4	6	2	3	4	5–6	7–10	11*	12	13–14	15	16–23	24–59
	U2	U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8
Virus respiratoires syncytiaux	Acm (dose unique) selon le mois de naissance <sup>a</sup>													
Rotavirus			P1 <sup>b</sup>	P2	(P3)									
Tétanos <sup>c</sup>				P1		P2			P3 <sup>f</sup>					
Diphthérie <sup>c</sup>				P1		P2			P3 <sup>f</sup>					
Coqueluche <sup>c</sup>				P1		P2			P3 <sup>f</sup>					
Hib <sup>b</sup> <i>H. influenzae</i> de type b				P1		P2			P3 <sup>f</sup>					
Poliomyélite <sup>c</sup>				P1		P2			P3 <sup>f</sup>					
Hépatite B <sup>c</sup>				P1		P2			P3 <sup>f</sup>					
Pneumocoques <sup>c,d</sup>				P1		P2			P3 <sup>f</sup>					
Méningocoques B <sup>c</sup>				P1		P2				P3 <sup>f</sup>				
Rougeole, oreillons, rubéole									P1			P2		
Varicelle									P1			P2		
Rendez-vous/date														

- Date recommandée de vaccination
- Période recommandée pour l'administration des Acm
- Période de rattrapage pour la primovaccination et l'administration des Acm

- P Primovaccination (P1 – P3)
- R Rappel
- S Vaccination standard
- Acm Anticorps monoclonaux

- a Les enfants nés entre avril et septembre doivent recevoir le nirsévimab à l'automne, avant le début de leur première saison du VRS ; les nouveau-nés, quel que soit leur âge gestationnel, nés pendant la saison du VRS (généralement entre octobre et mars) doivent recevoir le nirsévimab dès que possible après la naissance, idéalement à leur sortie de la maternité ou lors de la visite U2 (3e – 10e jour de vie).
- b Première dose de vaccin dès l'âge de 6 semaines ; selon le vaccin utilisé, 2 ou 3 doses à intervalles d'au moins 4 semaines
- c Prématurés : dose supplémentaire de vaccin à l'âge de 3 mois, soit 4 doses au total
- d Les nourrissons (y compris les prématurés) sont vaccinés avec le PCV13 ou le PCV15
- e Selon l'information professionnelle, la série vaccinale comprend 3 doses du vaccin entre les âges de 2 et 23 mois, et 2 doses à partir de 24 mois
- f Intervalle minimum depuis la dose précédente du vaccin : 6 mois

Modifié d'après : Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut. Epi-Bull 4/2026

# Calendrier vaccinal pour votre enfant

(vaccinations de routine pour les enfants à partir de 5 ans, les adolescents et les adultes, selon les recommandations de la STIKO<sup>1</sup>)



B – Enfants ≥ 5 ans, adolescents et adultes										
Vaccination	Âge en années									
	5 – 6	7 – 8	9 – 11	12 – 14	15 – 16	17	18 – 24	25 – 59	60 – 74	À partir de 75
	U9	U10	U11	J1		J2				
Tétanos	R1			R2				R <sup>b</sup>		
Diphthérie	R1			R2				R <sup>b</sup>		
Coqueluche	R1			R2			R3 <sup>b</sup>			
Poliomyélite				R1						
Hépatite B										
HPV – virus du papillome humain			P <sup>9</sup> et P2 <sup>9</sup>							
Méningocoques ACWY				P1**						
Rougeole							S <sup>i</sup>			
Oreillons, rubéole										
Varicelle										
Pneumocoques									S <sup>x</sup>	
Zona									P1/P2 <sup>i</sup>	
Grippe									S (annuel) <sup>m</sup>	
COVID-19							Px <sup>i</sup>		S (annuel) <sup>m</sup>	
Virus respiratoires syncytiaux										S <sup>n</sup>
Rendez-vous/date										

**g** Deux doses de vaccin à au moins 5 mois d'intervalle ; en cas de rattrapage à un âge ≥ 15 ans ou si l'intervalle entre la 1re et la 2e dose est < 5 mois, une 3e dose est nécessaire

**h** Rappel Td tous les 10 ans. Prochaine vaccination Td prévue : une seule dose sous forme de vaccin Tdap ou, si l'indication le justifie, sous forme de vaccin combiné Tdap-IPV

**i** Une dose de vaccin ROR pour toutes les personnes nées après 1970, âgées de 18 ans ou plus, dont le statut vaccinal est incertain, qui n'ont pas été vaccinées ou qui n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin pendant l'enfance

**j** Vaccination jusqu'à ce que le nombre requis de ≥ 3 contacts antigéniques SARS-CoV-2 (dont au moins 1 vaccination) nécessaires à l'immunité de base soit atteint. Intervalle minimal entre P1 et P2 : ≥ 4 semaines, de préférence 12 semaines, et entre la P2 et la P3 : ≥ 6 mois

[impfen.sanofi.de](https://www.impfen.sanofi.de)

**k** Vaccination avec PCV20

**l** 2 doses du vaccin inactivé contre le zona avec adjuvant, à un intervalle d'au moins 2 mois et d'au plus 6 mois

**m** Vaccination annuelle à l'automne

**n** Vaccination unique par un vaccin à protéines contre le VRS à la fin de l'été ou à l'automne, avant le début de la saison du VRS

\* Les vaccinations peuvent être réparties sur plusieurs rendez-vous. Les vaccins ROR et V peuvent être administrés lors d'un même rendez-vous ou à 4 semaines d'intervalle

\*\* Une dose d'un vaccin conjugué tétravalent contre les méningocoques des sérogroupe A, C, W et Y pour tous les enfants et adolescents âgés de 12 à 14 ans, avec une vaccination de rattrapage jusqu'à l'âge de 25 ans, quel que soit le statut vaccinal. Robert Koch-Institut (RKI)Epid Bull 2025; 44: 1-36

**sanofi**

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,  
Lützowstraße 107, 10785 Berlin