

Calendário de vacinação (vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação) para bebés, crianças, jovens e adultos¹

Português



Idade em	Semanas				Meses							Anos							
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	a partir dos 18	a partir dos 60	
Vacinação		U4			U5		U6				U7		U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2	
Rotavírus	G1 ^a		G2	(G3)															
Tétano ^b	G1		G2		G3 ^c										A1	A2		A'	
Difteria ^b	G1		G2		G3 ^c										A1	A2		A'	
Pertussis ^b	G1		G2		G3 ^c										A1	A2		A3 ^d	
Hib ^b – H. influenzae Tipo b)	G1		G2		G3 ^c														
Poliomielite ^b	G1		G2		G3 ^c										A1				
Hepatite B ^b	G1		G2		G3 ^c														
Pneumococo ^b	G1		G2		G3 ^c													S	
NOVO Meningocócica B ^e	G1		G2					G3 ^c											
Meningocócica C								G1											
Sarampo					G1					G2									S ^g
Papeira, rubéola					G1					G2									
Varicela					G1					G2									
HPV – Papilomavírus humano													G1 ⁱ G2 ^j						
Herpes zóster																			G1 ^k G2 ^k
Influenza																			S (anual) ^l
NOVO COVID-19																			G1 ^m , G2 ^m , G3 ^m S (anual) ⁿ

■ Data de vacinação recomendada

■ Período de recuperação da vacinação para imunização básica ou primeira imunização de todos os que ainda não foram vacinados ou para completar uma série incompleta de imunizações

Esclarecimentos

- G Imunização básica (em até 3 vacinações parciais G1–G3)
- A Vacinação de reforço
- S Vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

- a Primeira dose de vacinação a partir das 6 semanas de idade, dependendo da vacina utilizada, 2 ou 3 doses da vacina com pelo menos 4 semanas de intervalo.
- b Prematuros: dose adicional de vacina aos 3 meses de idade, para um total de 4 doses da vacina; bebés (incluindo bebés prematuros) são vacinados com PCV13 ou PCV15
- c De acordo com o resumo das características do medicamento, a série de vacinação consiste em 3 doses de vacina a partir dos 2–23 meses de idade e 2 doses de vacina a partir dos 24 meses de idade.
- d Intervalo de tempo mínimo relativamente à dose anterior: 6 meses.
- e Duas doses da vacina com um intervalo de pelo menos 5 meses, com vacinação de recuperação começando nos ≥ 15 anos de idade ou com intervalos de vacinação de < 5 meses, sendo que uma 3ª dose é necessária entre a 1ª e a 2ª dose.
- f Vacinação de reforço Td a cada 10 anos. Seguidamente, deve-se vacinar com Td uma vez com o Tdap ou, se indicado, como uma vacinação de combinação Tdap-IPV.

- g Vacinação única com uma vacina MMR para todas as pessoas nascidas após 1970 ≥ 18 anos com um estado de vacinação incerto, sem vacinação ou com apenas uma vacinação na infância.
- h Vacinação até que seja atingido o número de ≥ 3 contactos com o antígeno SARS-CoV-2 necessários para a imunidade básica (dos quais pelo menos 1 vacinação). Intervalo vacinal mínimo entre G1 e G2 ≥ 4 a preferencialmente 12 semanas, e entre G2 e G3 ≥ 6 meses
- i Vacinação com PCV20
- j Vacinação duas vezes com a vacina para herpes zóster com adjuvante num intervalo de pelo menos 2 a um máximo de 6 meses.
- k Vacinação anual no outono
- ⁿ As vacinações podem ser distribuídas em diversas consultas de vacinação. As MMR e V podem ser administradas na mesma data ou a cada 4 semanas.