


# Bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinler için aşı takvimi (standart aşılar)<sup>1</sup>

Türkçe



Aşı	Önerilen	Ay													Yıl					
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	18 ve üzeri	60 ve üzeri	
		U4			U5			U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2		
Rota virüsler		G1 <sup>a</sup>	G2	(G3)																
Tetanoz <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>							A1		A2				A'	
Difteri <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>							A1		A2				A'	
Pertusis <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>							A1		A2				A3'	
Hib <sup>b</sup> – H. influenza Tıp b)		G1		G2		G3 <sup>c</sup>														
Poliomyelit <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>									A1					
Hepatit B <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>														
Pnömonok <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>														
<b>YENİ</b> Meningokok B <sup>c</sup>		G1		G2				G3 <sup>c</sup>												
Meningokok C								G1												
Kızamık								G1		G2									S <sup>e</sup>	
Kabakulak, kızamıçık								G1		G2										
Varisella								G1		G2										
HPV – İnsan papilloma virüsü														G1 <sup>a</sup>	G2 <sup>a</sup>					
Herpes zoster																			G1 <sup>a</sup>	G2 <sup>a</sup>
İnfluenza																			S (yıllık) <sup>k</sup>	
<b>YENİ</b> COVID-19																			G1 <sup>b</sup> , G2 <sup>b</sup> , G3 <sup>b</sup>	S (yıllık) <sup>k</sup>

**A** Aşılamaya zamanı

**S** Henüz hiç aşılanmamış olanların temel veya birinci bağışıklama ya da bitmemiş bir aşılamaya serisinin tamamlanması için telafi aşılamaya süresi

## Açıklamalar

**G** Temel bağışıklama (3 doza kadar bölünebilir G1-G3)

**A** Tazeleme aşısı

**S** Standart aşı

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

- a** İlk aşı dozu 6 haftalık ve üstü bebeklere, kullanılan aşıya göre 2 veya 3 aşı dozu en az 4 haftalık aralıklarla.
- b** Erken doğanlar: 3 aylık bebeklere ek aşı dozu, yani toplam 4 aşı dozu; bebekler (prematüre bebekler dahil) PCV13 veya PCV15 ile aşılanır
- c** Teknik bilgilere göre aşı serisi, 2-23 aylık yaştan itibaren 3 doz, 24 aylık yaştan itibaren ise 2 doz arasında oluşuyor
- d** Bir önceki dozdan sonra bekleme süresi gereken minimum süre: 6 ay.
- e** İki aşı dozu arasında en az 5 ay bekleme süresi. 15 yaşından sonra başlayan telafi aşılarında veya iki doz arasındaki süre 5 aydan daha kısa ise 1. ve 2. dozlar arasında 3. bir doz gereklidir.
- f** Td tazeleme aşısı, 10 yılda bir. Zamanı gelen bir sonraki Td aşısı Tdap veya uygunluğu belirlenmiş Tdap-IPV kombinasyonlu aşısı şeklindedir.

**g** MMR aşısı maddesi içeren tek dozlu aşılamaya, aşı durumu belirsiz, hiç aşılanmamış ya da çocuklukta sadece bir kez aşılanmış 18 yaş ve üstü 1970 sonrası doğan herkes için.

**h** Temel bağışıklık için gerekli olan  $\geq 3$  SARS-CoV-2 antijen teması sayısına (en az 1 aşı) ulaşılan kadar aşılamaya. G1 ile G2 arasında minimum aşılamaya aralığı  $\geq 4$  ile tercihen 12 hafta ve G2 ile G3 arasında  $\geq 6$  ay

**i** PCV20 ile aşılamaya

**j** Adjuvan içeren herpes zoster inaktif bileşenli çift dozlu aşılamaya, en az 2, en fazla 6 ay aralıkla.

**k** Sonbaharda yıllık aşılamaya

\* Aşılamalar birkaç aşı randevusuna bölünebilir. MMR ve V aynı randevuda veya 4 haftalık bir arayla yapılabilir.