

Calendarul vaccinărilor (standard) pentru sugari, copii, tineri și adulți¹

Română



Vârsta în	Săptămâni										Luni							Ani					
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	peste 18 ani	peste 60 ani					
Vaccinare împotriva			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2							
Rotavirus	G1 ^a		G2	(G3)																			
Tetanos^b (trismus)	G1		G2		G3 ^c							A1		A2		A ^e							
Difterie^b	G1		G2		G3 ^c							A1		A2		A ^e							
Pertussis^b (Tuse convulsivă)	G1		G2		G3 ^c							A1		A2		A3 ^e							
Hib^b (H. influenzae Tip b)	G1		G2		G3 ^c																		
Poliomielita^b	G1		G2		G3 ^c									A1									
Hepatita B^b	G1		G2		G3 ^c																		
Pneumococi^b	G1		G2		G3 ^c											S ^g							
Meningococi C								G1															
Rujeolă					G1					G2						S ⁱ							
Oreion, rubeolă					G1					G2													
Varicelă (Vărsat de vânt)					G1					G2													
HPV (Virusul Papiloma uman)														G1 ^d G2 ^d									
Herpes zoster (zona zoster)																G1 ^h G ^h							
Gripă																S (anual)							

● Perioada recomandată pentru vaccinare ● Perioada de recuperare după imunizarea de bază sau primară a tuturor persoanelor încă nevaccinate sau pentru completarea unei serii incomplete de vaccinare

Explicații

G Imunizarea de bază (până la 3 vaccinări parțiale G1–G3)

A Vaccinare rapel

S Vaccinare standard

a Prima doză de vaccin de la vârsta de 6 săptămâni, în funcție de vaccinul utilizat, cu 2 sau 3 doze de vaccin la interval de cel puțin 4 săptămâni.

b Nou-născuți prematuri: doză suplimentară de vaccin la vârsta de 3 luni, adică în total 4 doze de vaccin.

c Intervalul minim față de doza anterioară: 6 luni.

d Două doze de vaccin la un interval de cel puțin 5 luni, cu vaccinare de recuperare începând cu vârsta > 14 ani sau la intervale de vaccinare < 5 luni, este necesară o a treia doză, între prima și a doua doză.

e Vaccinarea de rapel Td la fiecare 10 ani. Următoarea vaccinare Td scadentă o dată ca Tdap sau, dacă este indicat, ca vaccinare combinată Tdap-IPV.

f Vaccinarea unică cu un vaccin MMR pentru toate persoanele născute după 1970 ≥ 18 ani cu un statut de vaccinare neclar, fără vaccinare sau cu o singură vaccinare în copilărie.

g Vaccinarea cu vaccinul polizaharidic cu 23 de valențe.

h Vaccinare dublă cu vaccinul inactivat cu herpes zoster adjuvant, la un interval de cel puțin 2 până la max. 6 luni.

* Vaccinările pot fi distribuite pe mai multe sesiuni de vaccinare. MMR și V pot fi administrate la aceeași dată sau la intervale de aproximativ 4 săptămâni.