

Kalendari i vaksinimit 2026

(Imunizimet standarde me vakcina dhe antitropa monoklonalë [mAb])



A – Foshnjat dhe fëmijët e vegjël < 5 vjeç (0 – 59 muajsh)														
Vaksinimi/ Imunizimi	Mosha në javë			Mosha në muaj										
	0	4	6	2	3	4	5–6	7–10	11*	12	13–14	15	16–23	24–59
	U2	U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8
Viruset respiratore sinciale	mAb (dozë e vetme) në varësi të muajit të lindjes ^a													
Rotaviruset				G1 ^b	G2	(G3)								
Tetanozi ^c				G1		G2				G3 ^f				
Difteria ^c				G1		G2				G3 ^f				
Pertusis ^c				G1		G2				G3 ^f				
Hib ^b <i>H. gripi</i> / tipit b				G1		G2				G3 ^f				
Poliomieliti ^c				G1		G2				G3 ^f				
Hepatiti B ^c				G1		G2				G3 ^f				
Pneumokoket ^{c,d}				G1		G2				G3 ^f				
Meningokoket B ^e				G1		G2				G3 ^f				
Fruthi, shytat, rubeola										G1			G2	
Varicela										G1			G2	
Takimet/data														

- Koha e rekomanduar e vaksinimit
- Periudha e rekomanduar për dhënien e mAb
- Periudha e vaksinimit plotësues për imunizimin bazë ose fillestar dhe dhënien e mAb

- G Imunizimi bazë (G1 – G3)
- A Vaksinimi përforcues
- S Vaksinimi standard
- mAb antitropat monoklonale

- a Foshnjat e lindura midis prillit dhe shtatorit duhet të marrin Nirsevimab në vjeshtë para fillimit të sezonit të tyre të 1-të të RSV; të porsalindurit e çdo moshe gestacionale të lindur gjatë sezonit të RSV (zakonisht midis tetorit dhe marsit) duhet të marrin nirsevimab sa më shpejt të jetë e mundur pas lindjes, idealisht pas daljes nga reparti i maternitetit ose në ekzaminimin U2 (dita e 3-të – 10-të e jetës).
- b Doza e parë e vaksinës jepet që nga mosha 6 javë, me 2 ose 3 doza vakshine të dhëna në intervale prej të paktën 4 javësh, varësisht nga vakcina e përdorur
- c Foshnjat e parakohshme: dozë shtesë vakshine në moshën 3 muajsh, d.m.th., gjithsej 4 doza vakshine
- d Foshnjat (përfshirë foshnjat e parakohshme) vaksinohen me PCV13 ose PCV15
- e Sipas informacionit të produktit, seria e vaksinimit përbëhet nga 3 doza vakshine për fëmijët e moshës 2–23 muajsh dhe 2 doza vakshine për fëmijët e moshës 24 muajsh e lart
- f Intervali minimal që nga doza e mëparshme e vaksinës: 6 muaj

Modifikuar sipas: Rekomandimeve të komisionit të përhershëm të vaksinimit (STIKO) tek instituti Robert Koch. Epi-Bull 4/2026

Kalendari i vaksinimit për fëmijën tuaj

(Vaksinimet standarde për fëmijët 5 vjeç e lart, adoleshentët dhe të rriturit, sipas STIKO¹)



B – Fëmijët ≥ 5 Jahre, adoleshentë dhe të rritur										
Vaksinimi	Moshë në vite									
	5–6	7–8	9–11	12–14	15–16	17	18–24	25–59	60–74	mbi 75
	U9	U10	U11	J1		J2				
Tetanozi	A1			A2				A ^b		
Difteria	A1			A2				A ^b		
Pertusis	A1			A2			A3 ^b			
Poliomieliti				A1						
Hepatiti B										
HPV – Papillomavirusi Njerëzor			G ^o dhe G2 ^o							
Meningokoku ACWY				G1 ^{**}						
Fruthi							S ⁱ			
Shytat, rubeola										
Varicela										
Pneumokoket									S ^x	
Herpes zoster									G1 ⁱ /G2 ⁱ	
Gripi									S (çdo vit) ^m	
COVID-19							Gx ⁱ		S (çdo vit) ^m	
Viruset respiratore sinciale										S ⁿ
Takimet/data										

- g** Dy doza vaksine me të paktën 5 muaj diferencë; një dozë e 3-të vaksine kërkohet për vaksinimet plotësuese që fillojnë në moshën ≥ 15 vjeç, ose nëse intervali midis dozës së 1-rë dhe të 2-të të vaksinës është < 5 muaj
- h** Vaksinimi përforcues kundër Td çdo 10 vjet. Vaksinimi i radhës Td: 1 dozë si Tdap ose, nëse indikohet, si vaksinim i kombinuar Tdap-IPV
- i** Një dozë e vaksinës MMR për të gjithë personat e lindur pas vitit 1970 ≥ 18 vjeç me status të paqartë vaksinimi, të pavaksinuar ose me vetëm një vaksinim në fëmijëri
- j** Vaksinimi derisa të arrihet numri prej ≥ 3 kontaktesh të antigjenit SARS-CoV-2 të nevojshme për imunitetin bazë (nga të cilat të paktën 1 është vaksinim). Intervali minimal i vaksinimit midis G1 dhe G2 është nga ≥ 4 deri në mundësisht 12 javë, dhe midis G2 dhe G3 është nga ≥ 6 muaj
- k** Vaksinimi me PCV20

impfen.sanofi.de

- l** 2 doza të vaksinës së inaktivizuar të adjuvuar kundër herpes zoster, të administruara me të paktën 2 dhe më së shumti 6 muaj larg njëra-tjetrës
- m** Vaksinimi vjetor në vjeshtë
- n** 1 vaksinim me një vaksinë kundër RSV me bazë proteinash në fund të verës/vjeshtës para fillimit të sezonit të RSV
- *** Vaksinimet mund të shpërndahen në disa takime vaksinimi. MMR dhe V mund të jepen në të njëjtën datë ose me një diferencë prej 4 javësh
- **** Një dozë e një vaksine konjugate katërvalente kundër meningokokut të serogrupeve A, C, W dhe Y për të gjithë fëmijët dhe adoleshentët e moshës 12 deri në 14 vjeç, me vaksinim plotësues deri në moshën 25 vjeç, pavarësisht nga statusi i vaksinimit. Instituti Robert Koch (RKI)Epid Bull 2025; 44: 1-36

sanofi

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Lützowstraße 107, 10785 Berlin

MAT-DE-2400751-3-0-05/2026