

Calendario de vacunación para niños, adolescentes y adultos en el Estado Libre de Sajonia. (estado 01.01.2024)

Vacuna#	Postnatal	6 semanas	2 meses	3 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses (1 año)	14 meses	23 meses	4 años	5 años	9 años	10 años	25 años	≥ 50 años	≥ 60 años	cada 10 años		
Hepatitis B y Hepatitis A (VHB/VHA)		VHB 1/VHB 2 (intervalo > 4 semanas)						VHB 3/4 o VHA 1 ► HAV 2 (intervalo 6–12 meses) o VHA/VHB 1 ► VHA/VHB 2 (intervalo > 4 semanas) ► VHA/VHB 3 (intervalo 6–12 meses)												
Difteria, tétanos, Tos ferina *			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3			DTPa 4			DTPa 5			Tdap					Tdap	
Haemophilus influenzae tipo b *			Hib 1	*	Hib 2			Hib 3												
Polio (IPV) * (trivalente)			IPV 1	*	IPV 2			IPV 3						IPV 4					IPV	
Sarampión, parotiditis, rubéola (MMR)								MMR 1	MMR 2				MMR 3†							
Varicela (VZ)								VZV 1	VZV 2											
Meningococo B			Meningococo (grupo B)																	
Meningococo ACWY/C			Meningococo (grupos ACWY/C)																	
Gripe **								Gripe anual												
COVID-19 **																			COVID-19	
Neumococo ***			PCV 1 ► PCV 2 (intervalo > 2 meses), PCV 3 (intervalo > 7 meses)															Neumococo		
Rotavirus		Rotavirus																		
Virus del papiloma humano (VPH) ***													≤ 14 años VPH1 ► VPH 2 ≥ 15 años HPV1 ► HPV2 ► HPV3							
Herpes zóster ***																			RZV 1 ► RZV 2 (intervalo > 6 meses)	

¡Es imprescindible observar el resumen de las características del producto para las respectivas vacunas y las siguientes tablas con información sobre la aplicación y los intervalos de vacunación! * Todas las personas susceptibles (ver tablas a continuación). * Para las combinaciones de antígenos que contienen un componente de tos ferina, se requieren tres inyecciones en la infancia; En los bebés nacidos a término, se puede omitir la segunda vacunación planificada a los 3 meses de edad cuando se utilizan vacunas de 6 o 5 veces (el llamado esquema 2 + 1). ** Refuerzo estacional anual con una vacuna adaptada a las variantes del virus circulante (COVID-19) o cepa (gripe). *** Se recomiendan preferentemente las siguientes vacunas: Neumococo (a partir de los 18 años): Vacuna conjugada 20-valente (PCV20), VPH: Vacuna 9-valente; herpes zoster: vacuna recombinante adyuvada (RZV)