

Calendarul vaccinărilor (standard) pentru sugari, copii, tineri și adulți¹

Română



	Vârsta în	Săptămâni				Luni										Aniani																													
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	peste 18 ani	peste 60 ani																										
Vaccinare		U4				U5					U6					U7					U7a/U8					U9					U10					U11/J1					J2				
Rotavirus		G1 ^a		G2	(G3)																																								
Tetanoș ^b		G1		G2		G3 ^d					A1					A2					A'																								
Difterie ^b		G1		G2		G3 ^d					A1					A2					A'																								
Pertussis ^b		G1		G2		G3 ^d					A1					A2					A3'																								
Hib ^b – H. influenzae Tip b		G1		G2		G3 ^d																																							
Poliomielita ^b		G1		G2		G3 ^d															A1																								
Hepatita B ^b		G1		G2		G3 ^d																																							
Pneumococi ^b		G1		G2		G3 ^d																		S																					
NOU Meningococi B ^b		G1		G2							G3 ^d																																		
Meningococi C												G1																																	
Rujeolă												G1					G2					S ^e																							
Oreion, ruzeolă												G1					G2																												
Varicelă												G1					G2																												
HPV – Virusul Papiloma uman																						G1*					G2*																		
Herpes zoster																																G1					G2								
Gripă																																S (anual) ^k													
NOU COVID-19																											G1*, G2*, G3*					S (anual) ^k													

■ Perioada recomandată pentru vaccinare

■ Perioada de recuperare după imunizarea de bază sau primară a tuturor persoanelor încă nevaccinate sau pentru completarea unei serii incomplete de vaccinări

Explicații

G Imunizarea de bază (până la 3 vaccinări parțiale G1–G3)

A Vaccinare rapel

S Vaccinare standard

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

a Prima doză de vaccin de la vârsta de 6 săptămâni. În funcție de vaccinul utilizat, cu 2 sau 3 doze de vaccin la interval de cel puțin 4 săptămâni.

b Nou-născuți prematuri: doză suplimentară de vaccin la vârsta de 3 luni, adică în total 4 doze de vaccin; sugarii (inclusiv bebeluși prematuri) sunt vaccinați cu PCV13 sau PCV15

c Conform rezumatului caracteristicilor produsului, seria de vaccinare constă din 3 doze de vaccin de la vârsta de 2-23 luni și 2 doze de vaccin de la vârsta de 24 de luni

d Intervalul minim față de doza anterioară: 6 luni.

e Două doze de vaccin la un interval de cel puțin 5 luni, cu vaccinare de recuperare începând cu vârsta ≥ 15 ani sau la intervale de vaccinare < 5 luni, este necesară o treia doză, între prima și a doua doză.

f Vaccinarea de rapel Td la fiecare 10 ani. Următoarea vaccinare Td scadentă o dată ca Tdap sau, dacă este indicat, ca vaccinare combinată Tdap-IPV.

g Vaccinarea unică cu un vaccin MMR pentru toate persoanele născute după 1970 ≥ 18 ani cu un statut de vaccinare neclar, fără vaccinare sau cu o singură vaccinare în copilărie.

h Vaccinarea până la atingerea numărului de ≥ 3 contacte cu antigenul SARS-CoV-2 necesar pentru imunitatea de bază (din care cel puțin 1 vaccinare). Interval minim de vaccinare între G1 și G2 ≥ 4 până la de preferință 12 săptămâni și între G2 și G3 ≥ 6 luni

i Vaccinarea cu PCV20

j Vaccinare dublă cu vaccinul inactivat cu herpes zoster adjuvant, la un interval de cel puțin 2 până la max. 6 luni.

k Vaccinarea anuală toamnă

* Vaccinările pot fi distribuite pe mai multe sesiuni de vaccinare. MMR și V pot fi administrate la aceeași dată sau la intervale de aproximativ 4 săptămâni.

MAT-DE-2400751-V1.0-02/2024