

Kalendarz szczepień (szczepienia standardowe) dla niemowląt, dzieci, nastolatków i dorosłych¹

Język polski



Wiek w	tygodniach			miesiącach							latach							
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	od 18	od 60
Szczepienie na	U4			U5	U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2			
Rotawirusy	G1 ^a	G2	(G3)															
Tężec^b	G1		G2			G3 ^c						A1		A2				A ^e
Błonica^b	G1		G2			G3 ^c						A1		A2				A ^e
Krzusiec^b (koklusz)	G1		G2			G3 ^c						A1		A2				A3 ^e
Hib^b (H. influenzae typu b)	G1		G2			G3 ^c												
Polio^b (nagminne porażenie dziecięce)	G1		G2			G3 ^c								A1				
Zapalenie wątroby typu B^b	G1		G2			G3 ^c												
Pneumoki^b	G1		G2			G3 ^c												S ^g
Meningokoki grupy C							G1											
Odrę						G1			G2									S ⁱ
Świniekę, różyczkę						G1			G2									
Ospę wietrzną (Varicella)						G1			G2									
HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)														G1 ^d G2 ^d				
Półpasiec																		G1 ^h G ^h
Grypę (Influenza)																		S (corocznie)

 Zalecany termin szczepienia Termin szczepienia uzupełniającego w przypadku uodpornienia podstawowego albo pierwszego u wszystkich niezaszczepionych osób lub uzupełniających niekompletną serię szczepień

Objaśnienia

G Uodpornienie podstawowe (w maks. 3 szczepieniach częściowych G1–G3)

A Szczepienie przypominające

S Szczepienie standardowe

a Podanie pierwszej dawki szczepionki powinno nastąpić już w wieku 6 tygodni; w zależności od użytej szczepionki wymagane są 2 lub 3 dawki podawane w odstępie co najmniej 4 tygodni.

b Wcześniaki: dodatkowa dawka szczepionki w wieku 3 miesięcy, a więc łącznie 4 dawki.

c Minimalny odstęp od poprzedniej dawki: 6 miesięcy.

d Dwie dawki podawane w odstępie co najmniej 5 miesięcy, w przypadku szczepienia uzupełniającego od wieku > 14 lat

albo w przypadku odstępu między szczepieniami wynoszącego < 5 miesięcy między 1. a 2. dawką wymagana jest 3. dawka.

e Szczepienie przypominające DT co 10 lat. Następne planowe szczepienie DT wykonać jednorazowo jako szczepionkę skojarzoną DTP, a w razie odpowiedniego wskazania jako DTaP-IPV.

f Jednorazowe szczepienie MMR dla wszystkich osób urodzonych po roku 1970 ≥ 18 lat z niejasnym statusem szczepienia, bez szczepienia lub z tylko jednym szczepieniem w dzieciństwie.

g Szczepienie 23-walentną szczepionką polisacharydową.

h Dwukrotne szczepienie szczepionką adjuwantową przeciwko wirusowi półpasęca, wykonywane w odstępie wynoszącym min. 2 miesiące, a maks. 6 miesięcy.

* Szczepienia można podzielić na kilka wizyt. Szczepienia MMR I V można wykonywać przy tej samej wizycie albo z 4-tygodniowym odstępiem.