

Kalendar cijepljenja (standardna cijepljenja) za dojenčad, djecu, mlade i odrasle¹

Hrvatski



Starosna dob u	Tjednima	Mjesecima										Godinama						
	6	2	3	4	5 – 10	11*	12	13 – 14	15	16 – 23	2 – 4	5 – 6	7 – 8	9 – 14	15 – 16	17	od 18	od 60
Cijepljenje protiv			U4		U5	U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2		
Rotavirusi	G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanus ^b (bolni mišićni grčevi)	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A ^e			
Difterija ^b	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A ^e			
Pertussis ^b (hripavac)	G1		G2		G3 ^c						A1		A2		A3 ^e			
Hib ^b (H. influenzae Tip b)	G1		G2		G3 ^c													
Poliomijelitis ^b (dječja paraliza)	G1		G2		G3 ^c								A1					
Hepatitis B ^b	G1		G2		G3 ^c													
Pneumokoki ^b	G1		G2		G3 ^c										S ^g			
Meningokoki C								G1										
Ospice					G1			G2							S ⁱ			
Zaušnjaci, rubeola					G1			G2										
Varičele (vodene kozice)					G1			G2										
HPV (humani papilomavirusi)													G1 ^d G2 ^d					
Herpes zoster															G1 ^h G ^h			
Influenza (gripa)															S (godišnje)			

■ Preporučeno vrijeme cijepljenja ■ Vrijeme nadoknade za osnovnu, tj. prvu imunizaciju onih osoba koje još nisu cijepljene, tj. za upotpunjavanje nepotpune serije cijepljenja

Objašnjenja

G Osnovna imunizacija (može obuhvaćati do 3 cijepljenja G1–G3)

A Ponovno cijepljenje

S Standardno cijepljenje

- a** Prva doza cjepiva već od navršениh 6 tjedana života, ovisno o korištenom cjepivu 2, tj. 3 doze cjepiva u razmaku od najmanje 4 tjedna.
- b** Nedonoščad: dodatna doza cjepiva u dobi od 3 mjeseca, tj. ukupno 4 doze cjepiva.
- c** Minimalni vremenski razmak u odnosu na prethodnu dozu: 6 mjeseci.
- d** Dvije doze cjepiva u razmaku od najmanje 5 mjeseci, u slučaju nadoknade cjepiva počevši u dobi od > 14 godina ili

ako razmak između cijepljenja iznosi < 5 mjeseci, između 1. i 2. doze potrebna je 3. doza.

e Ponovno cijepljenje protiv tetanusa i difterije svakih 10 godina. Sjedeće po redu cijepljenje protiv tetanusa i difterije kao Tdap cijepljenje, tj. u slučaju odgovarajuće indikacije kao kombinirano cijepljenje Tdap-IPV.

f Jednokratno cijepljenje MMR cjepivom za sve osobe rođene nakon 1970. ≥ 18 godina s nejasnim statusom cijepljenja, bez cijepljenja ili samo s jednim cijepljenjem tijekom djetinjstva.

g Cijepljenje 23-valentnim polisaharidnim cjepivom.

h Dvokratno cijepljenje adjuvantiranim, neaktivnim cjepivom protiv herpes zoster, u razmaku od najmanje 2 do najviše 6 mjeseci.

* Cijepljenja se mogu raspodijeliti na više termina cijepljenja. MMR i V mogu se davati na istom terminu ili u razmaku od 4 tjedana.