

Ημερολόγιο εμβολιασμού για παιδιά, νέους και ενήλικες στην Ελεύθερη Πολιτεία της Σαξονίας. (Κατάσταση 01.01.2024)

Εμβόλιο*	Μετα-γεννητική	6 εβδομάδες	2 μήνες	3 μήνες	4 μήνες	6 μήνες	11 μήνες	12 μήνες (1 χρόνος)	14 μήνες	23 μήνες	4 χρόνια	5 χρόνια	9 χρόνια	10 χρόνια	25 χρόνια	≥ 50 χρόνια	≥ 60 χρόνια	κάθε 10 χρόνια
Ηπατίτιδα Β και Ηπατίτιδα Α (HBV/HAV)	HBV 1/HBV 2 (διάστημα > 4 εβδομάδες)						HBV 3/4 ή HAV 1 ► HAV 2 (διάστημα 6–12 μήνες) ή HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (διάστημα > 4 εβδομάδων) ► HAV/HBV 3 (διάστημα 6–12 μήνες)											
Διφθερίτιδα τέτανος, κοκκύτης *			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3			DTPa 4			DTPa 5			Tdap				Tdap
<i>Haemophilus influenzae</i> τύπου β *			Hib 1	*	Hib 2			Hib 3										
Πολιομελίτις (IPV) * (τρισηθενής)			IPV 1	*	IPV 2			IPV 3						IPV 4				IPV
Ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά (MMR)							MMR 1		MMR 2				MMR 3†					
Ανεμβολιογία (VZV)							VZV 1		VZV 2									
Μηνιγγιτιδόκοκκοι Β			Μηνιγγιτιδόκοκκοι (ομάδα Β)															
Μηνιγγιτιδόκοκκοι ACWY/C			Μηνιγγιτιδόκοκκοι (ομάδες ACWY/C)															
Influenza **			Influenza ετησίως															
COVID-19 **																		COVID-19
Πνευμονιόκοκκοι ***			PCV 1 ► PCV 2 (διάστημα > 2 μηνών), PCV 3 (διάστημα > 7 μηνών)															
Ροταϊοί			Ροταϊοί															
Ιοί των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) ***													≤ 14 ετών HPV1 ► HPV 2 ≥ 15 ετών HPV1 ► HPV2 ► HPV3					
Έρπης ζωστήρας ***															RZV 1 ► RZV 2 (διάστημα >6 μηνών)			

Είναι απαραίτητο να τηρείτε την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για τα αντίστοιχα εμβόλια και τους παρακάτω πίνακες με πληροφορίες σχετικά με τα διαστήματα εφαρμογής και εμβολιασμού!
 † Όλα τα ευπαθή άτομα (βλ. πίνακες παρακάτω) * Για συνδυασμούς αντιγόνων που περιέχουν συστατικό κοκκύτη, απαιτούνται τρεις ενέσεις στη βρεφική ηλικία. Στα τελειόμηνα βρέφη, ο δεύτερος εμβολιασμός που έχει προγραμματιστεί σε ηλικία 3 μηνών μπορεί να παραλειφθεί όταν χρησιμοποιούνται 6- ή 5-πλάσια εμβόλια (ονειρευόμεια σχέδιο 2 + 1). ** Ετήσιο εποχιακό ενισχυτικό με εμβόλιο προσαρμοσμένο στις παραλλαγές του κυκλοφορούντος ιού (COVID-19) ή στο στέλεχος (γρίπη) *** Τα ακόλουθα εμβόλια συνιστώνται κατά προτίμηση: Πνευμονιόκοκκοι (από την ηλικία των 18 ετών): 20-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο (PCV20), HPV: 9-δύναμο εμβόλιο- έρπης ζωστήρας: ανασυνδυασμένο, επικουρικό εμβόλιο (RZV)