



Szczepionka	Narodziny	7. tydz. <sup>1</sup>	3. mies. <sup>1</sup>	4. mies. <sup>1</sup>	5. mies. <sup>1</sup>	6. mies. <sup>1</sup>	12. mies. <sup>1</sup>	13. Mon. <sup>1</sup>	15. mies. <sup>1</sup>	24. Mon. <sup>1</sup>	5. r.ż. <sup>1</sup>	6. r.ż. <sup>1</sup>	10. r.ż. <sup>1</sup>	11. r.ż. <sup>1</sup>	18. r.ż. <sup>1</sup>	26. r.ż. <sup>1</sup>	co 10 lat	po 50 r.ż.	po 60 r.ż.	
WZW typu B <sup>3,6</sup> i WZW typu A <sup>6</sup> (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 <sup>3</sup>						HBV 3/4 3 albo HAV/HBV <sup>6</sup>			HAV/HBV <sup>6</sup>									
Błonica, tężec, krztusiec <sup>2,3,4</sup>			1. DTPa	2. <sup>3</sup> DTPa	3. DTPa			4. DTPa				5. DTPa lub Tdpa <sup>4</sup>		Tdpa				Tdpa		
Haemophilus influenzae typu b <sup>4,3</sup>			1. Hib	<sup>3</sup>	2. Hib			3. Hib												
Polio (IPV) <sup>2,3</sup> (trójwartościowa)			1. IPV	<sup>3</sup>	2. IPV			3. IPV						4. IPV				IPV		
Odra, świnka, różyczka (MMR) <sup>13</sup>							1. MMR	2. MMR					3. MMR <sup>13</sup>							
Ospa wietrzna (VZV) <sup>5</sup>							1.VZV	2.VZV												
Meningokoki B <sup>12</sup>			Meningokoki (grupa B)																	
Meningokoki ACWY/C <sup>7</sup>			Meningokoki (grupy ACWY/C)																	
Grypa <sup>8</sup>			Corocznie <sup>8</sup>																	
Pneumokoki			Pneumokoki <sup>9</sup>																	
Rotawirusy <sup>10</sup>			Rotawirusy																	
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) <sup>11</sup>																				
Półpasiec																				Półpasiec

\* SIKO = Saksońska Komisja Szczepień

Stan: 09/2022

- Definicja terminów: Skrótly oznaczają np.: 3. mies. = od 3. miesiąca = ukończony 2. miesiąc; 7. tydzień = od 7. tygodnia = ukończony 6. tydzień; 6 r.ż. = od 5. urodzin.
- Odstęp między szczepieniami 1–3 lub 1 i 2 co najmniej 4 tygodnie, między 3 a 4. lub 2. a 3. szczepieniem w celu uzupełnienia uodpornienia podstawowego co najmniej 6 miesięcy.
- W przypadku kombinacji antygenów, które zawierają komponenty krztusca, wymagane są 3 iniekcje w wieku niemowlęcym. W przypadku niemowląt nieurodzonych przedwcześnie (czyli przed 37. tygodniem ciąży) przy zastosowaniu szczepionek 6 w 1 albo 5 w 1 (przestrzegać informacji medycznych) można zrezygnować z 2. szczepienia przewidzianego w 4. miesiącu życia (dla wieku 3 miesięcy) (schemat szczepienia 2+1 zgodnie z zaleceniami Stałej Komisji Szczepień STIKO przy Instytucie Roberta Kocha na lata 2020/2021). Wynika z tego co najmniej 8-tygodniowy odstęp między 1. (3. miesiąc życia) a 2. (5 miesiąc życia) szczepieniem. Odstęp między szczepieniami 3. oraz 4. (w przypadku schematu szczepienia 3+1), a także między szczepieniem 2. a 3. (przy schemacie szczepienia 2+1) wynosi co najmniej 6 miesięcy.
- Od 6. r.ż. należy przestrzegać informacji medycznych dotyczących szczepionek w związku z ograniczeniem wiekowym pod kątem zredukowanej zawartości anatoksyny D.
- Wszystkie niezaszczepione dzieci/nastolatki z ujemnym wywiadem lekarskim pod kątem ospy wietrznej i wszyscy podatni na zachorowanie dorośli jako szczepienie uzupełniające.
- Od 2. r.ż. zalecana jest szczepionka skojarzona HAV/HBV, jeżeli uodpornienie podstawowe przeciwko HBV nie zostało rozpoczęte w wieku niemowlęcym; jeżeli tak, wówczas szczepionka monowaletna przeciwko WZW typu A.
- W 1. r.ż. 2 iniekcje (przestrzegać informacji producenta), od 2. r.ż. 1 iniekcja. W przypadku szczepienia w wieku niemowlęcym zaleca się szczepienie przypominające od 2. roku życia. Do szczepień należy użyć skoniugowanej szczepionki czterowalentnej (serogrupy ACWY) zgodnie z dopuszczeniem dla określonego wieku. Wszystkie dzieci i nastolatki od 11. roku życia do ukończenia 18. roku życia: szczepienie przypominające lub pierwsze szczepienie z użyciem skoniugowanej szczepionki czterowalentnej (serogrupy ACWY).
- Od ukończenia 6. miesiąca życia.
- Szczepienie standardowe zaleca się do 24. miesiąca życia zgodnie z odpowiednim schematem immunizacji przy użyciu szczepionki skoniugowanej, w przypadku dzieci po 24. miesiącu życia zaleca się jedynie szczepienia na podstawie wskazania.
- Ustna szczepionka zawierająca 2 lub 3 dawki (przestrzegać informacji producenta), szczepienie równoległe patrz E1, strona 8 i 14 (stopka\*\*\*\*\*).
- Wszystkie dziewczęta i kobiety, wszyscy chłopcy i mężczyźni – preferowana szczepionka 9-walentna, przestrzegać schematów immunizacji (schemat 2 lub 3 dawek, w zależności od wieku podania szczepienia).
- Schemat szczepienia według informacji producenta; możliwa szczepionka skojarzona obejmująca D, T, Pa, Hib, IPV, HBV, szczepionkę skoniugowaną przeciwko pneumokokom, MMR, VZV (monowaletna lub skojarzona).
- Przy pierwszym szczepieniu w 1. roku życia, jak i przy pierwszym i drugim szczepieniu do ukończonego czwartego roku życia.