

الجدول الزمني للتطعيمات (القياسية) المعطاة للرضع والأطفال الصغار والبالغين¹

العربية



العمر بعدد	الشهور																التطعيم ضد		
	6	2	3	4	10-5	*11	12	14-13	15	23-16	4-2	6-5	8-7	14-9	16-15	17		بدءًا من 18	بدءًا من 60
	U4			U5		U6		U7	U7	U8/U7a	U9	U10	J1/U11	J2					
الفيروسات العجالية	G1	G2	(G3)																
التيتانوس* (الكزاز)	G1	G2	G3																
الدفتريا*	G1	G2	G3																
الشاهوق* (السعال الديكي)	G1	G2	G3																
المستدمية النزلية* (النزلة التنفسية من النوع ب)	G1	G2	G3																
التهاب سنجابية الشخاخ* (مثل الأطفال)	G1	G2	G3																
التهاب الكبد ب*	G1	G2	G3																
المكورات الرئوية*	G1	G2	G3																
المكورات السحائية سي	G1																		
الحصية	G1	G2																	
التكاف، والحصية الألمانية	G1	G2																	
جدري الماء (الحماق)	G1	G2																	
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)	G1, G2																		
التهربس النطاقي	G1, G2																		
الإفلقونزا (الزكام)	S																		

● موعد التطعيم المواسمي به □ الفترة الزمنية لاستدراك التطعيم للتحصين الأساس أو الأول لكل من لم يتم تطعيمهم أو لإكمال سلسلة تطعيم غير مكتملة

الشرحات
G حرف
A حرف
S حرف
 تطعيم مجد
 تطعيم قباسي

أ جرعة التطعيم الأولى تبدأ بسن 6 أسابيع، حسب الفلاح المستخدم إلى 2-3 جرعات من الفلاح على مسافة زمنية متباعدة أذاها 4 أسابيع.
 ب المولودون قبل الأوان: جرعة تطعيم إضافية في عمر 3 أشهر، أي 4 جرعات تطعيم في المجمع.
 ج المسافة الزمنية الدنيا الفاصلة عن الجرعة السابقة: 6 أشهر.

د جرعتا تطعيم بينهما مسافة زمنية فاصلة قدرها 5 أشهر، وفي حالة التطعيم الاستراكي تبدأ بسن < 14 سنة أو في حالة فاصل تطعيم زمني قدره > 5 أشهر، تكون ذلك ضرورية لجرعة ثالثة بين الجرعتين الأولى والثانية.
 ح التطعيم المجدد للتيتانوس والدفتريا كل 10 سنوات. تطعيم التيتانوس والدفتريا المستحق ثانياً مرة في شكل تطعيم للتيتانوس والدفتريا والسعال الديكي أو في حالة وجود مؤشر ذي صلة في شكل تطعيم مركب للتيتانوس والدفتريا والسعال الديكي مع فلاح مُعطل لثقل الأطفال.
 ف تطعيم امرأة واحدة مع فلاح الحصية والتكاف والحصية الألمانية لكل من وُلدوا بعد عام 1970 ≤ 18 سنة مع حالة تطعيم مجهزة أو دون تطعيم واحد آخر في الطفولة.
 و تطعيم باستخدام فلاح العقيدات الرئوية بعيد السكريد ذي التكافؤ 23.
 هـ تطعيم لمرتين باستخدام فلاح الهربس النطاقي المُكتمل غير النشط على مسافة زمنية قدرها من 2 إلى 6 أشهر بحد أقصى.
 * يمكن توزيع التطعيمات على مواعيد تطعيم متعددة: اللقاح ضد الحصية والتكاف والحصية الألمانية ولفاح جدري الماء يمكن حقنها في الموعد نفسه أو على مسافة زمنية قدرها 4 أسابيع.