

# Calendrier des vaccinations (vaccinations standard) pour nourrissons, enfants, adolescents et adultes<sup>1</sup>

Français



Vaccination contre	Âge en semaines			mois							ans							
	6	2	3	4	5 à 10	11*	12	13 à 14	15	16 à 23	2 à 4	5 à 6	7 à 8	9 à 14	15 à 16	17	à partir de 18	à partir de 60
				U4	U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotavirus	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)														
Tétanus <sup>b</sup> (Tétanos)		G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2				A <sup>e</sup>
Diphthérie <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2				A <sup>e</sup>
Pertussis <sup>b</sup> (Coqueluche)		G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2				A3 <sup>e</sup>
Hib <sup>b</sup> ( <i>Haemophilus influenzae</i> Type b)		G1		G2		G3 <sup>c</sup>												
Poliomyélite <sup>b</sup> (Poliomyélite)		G1		G2		G3 <sup>c</sup>								A1				
Hépatite B <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>												
Pneumocoques <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>												S <sup>g</sup>
Méningocoques C							G1											
Rougeole						G1			G2									S <sup>i</sup>
Oreillons, rubéole						G1			G2									
Varicella (Varicelle)						G1			G2									
HPV (Papillomavirus humain)														G1 <sup>d</sup>   G2 <sup>d</sup>				
Herpès zoster																		G1 <sup>h</sup>   G <sup>h</sup>
Influenza (Grippe)																		S (annuel)

■ Période de vaccination recommandée ■ Période de rattrapage des vaccinations de base, ou première immunisation de personnes non vaccinées, ou en complément d'une vaccination non achevée

## Explications

**G** Immunisation de base (jusqu'à 3 vaccinations partielles G1–G3)

**A** Vaccin de rappel

**S** Vaccin standard

**a** Première dose de vaccin dès l'âge de 6 ans, selon le vaccin utilisé, 2 ou 3 injections, à des intervalles de 4 semaines au moins.

**b** Prématurés : une dose de vaccin supplémentaire à l'âge de 3 mois, soit au total 4 doses de vaccin.

**c** Intervalle entre les doses : 6 mois

**d** Deux doses de vaccin à des intervalles de 5 mois au moins pour les rattrapages de vaccination qui commencent à un âge > 14 ans ou pour des intervalles de vaccination < 5 mois, une troisième dose est nécessaire entre la

première et la deuxième.

**e** Vaccin Td de rappel tous les 10 ans. Prochaine vaccination Td unique comme vaccin DTaP ou en cas d'indication correspondante comme vaccin combiné DTaP-IPV.

**f** Vaccination unique avec un vaccin ROR pour toutes les personnes ≥ 18 ans nées après 1970 avec un état vaccinal incertain, sans vaccination ou avec une seule vaccination dans l'enfance.

**g** Vaccination avec le vaccin polysaccharidique 23-valent.

**h** Vaccination en deux étapes avec le vaccin avec adjuvant contre l'herpès zoster à des intervalles minimaux de 2 à 6 mois max.

\* Les différentes vaccinations peuvent être réparties sur plusieurs dates de vaccination. ROR et V peuvent être administrés à la même date ou à des intervalles de 4 semaines.