

Kalendar cijepljenja za djecu, adolescente i odrasle u Slobodnoj državi Saskoj. (Stanje 01.01.2024.)



Cjepivo#	Postnatalni	6 tjedni	2 mjeseca	3 mjeseca	4 mjeseca	6 mjeseca	11 mjeseca	12 mjeseca (1 godina)	14 mjeseca	23 mjeseca	4 godine	5 godine	9 godine	10 godine	25 godine	≥ 50 godine	≥ 60 godine	svakih 10 godina	
Epatite B i Epatite A (HBV/HAV)	HBV1/HBV 2 (interval > 4 tjedna)							HBV 3/4 ili HAV 1 ► HAV 2 (interval 6-12 mjeseci) ili HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (interval > 4 tjedna) ► HAV/HBV 3 (interval 6–12 mjeseci)											
Difterija, tetanus hripavac			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3			DTPa 4				DTPa 5		Tdap				Tdap	
Haemophilus influenzae Tip b*			Hib 1	*	Hib 2			Hib 3											
Dječja paraliza (IPV)* (trovalentan)			IPV 1	*	IPV 2			IPV 3						IPV 4				IPV	
Ospice, zaušnjaci, rubeola (MMR)							MMR 1	MMR 2					MMR 3†						
Varičele (VZV)							VZV 1	VZV 2											
Meningokoki	Meningokoki (skupina B)																		
Meningokoki ACWY/C	Meningokoki (skupine ACWY/C)																		
Influenza	Influenza godišnje																		
COVID-19 **																		COVID-19	
Pneumokoki			PCV 1 ► PCV 2 (interval > 2 mjeseca), PCV 3 (interval > 7 mjeseci)														Pneumokoki		
Rotavirusi		Rotavirusi																	
Humani papiloma-virusi (HPV) ***													≤ 14 godina HPV1 ► HPV 2 ≥ 15 godina HPV1 ► HPV2 ► HPV3						
Herpes zoster ***																	RZV 1 ► RZV 2 (interval >6 mjeseci)		

Obavezno se pridržavajte sažetka opisa svojstava lijeka za pojedina cjepiva i sljedećih tablica s podacima o primjeni i intervalima cijepljenja! * Sve osjetljive osobe (vidi tablice u nastavku) * Za kombinacije antigena koje sadrže komponentu pertusisa, potrebne su tri injekcije u dojenačkoj dobi; Kod donošene dojenčadi, drugo cijepljenje planirano u dobi od 3 mjeseca može se izostaviti ako se koriste 6- ili 5-struka cjepiva (poznat kao raspored 2 + 1). ** Godišnje sezonsko docijepljivanje cjepivom prilagođenim varijantama cirkulirajućeg virusa (COVID-19) ili soju (influenca) *** Sljedeća cjepiva se preporučuju kao prednost: pneumokokini (od 18 godina): 20-valentno konjugirano cjepivo (PCV20), HPV: 9-valentno cjepivo; herpes zoster: rekombinantno cjepivo s adjuvansom (RZV)