

Календарь прививок (стандартных) для новорожденных, детей, подростков и взрослых¹

Русский



Возраст	Нед.			Мес.										Годы/лет					
	6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	с 18	с 60	
Вакцинация	U4				U5			U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2	
Ротавирусная инфекция	G1 ^a	G2	(G3)																
Тетанус ^b	G1		G2			G3 ^a								A1		A2		A'	
Дифтерия ^b	G1		G2			G3 ^a								A1		A2		A'	
Коклюш ^b	G1		G2			G3 ^a								A1		A2		A3'	
Гемофильная инфекция ^b – Haemophilus influenzae, тип b	G1		G2			G3 ^a													
Полиомиелит ^b	G1		G2			G3 ^a									A1				
Гепатит В ^b	G1		G2			G3 ^a													
Пневмококковая инфекция ^b	G1		G2			G3 ^a													S
Менингококковая инфекция типа В ^c	G1		G2				G3 ^a												
Менингококковая инфекция типа С							G1												
Корь						G1			G2									S ^e	
Свинка, краснуха						G1			G2										
Ветряная оспа						G1			G2										
ВПЧ – вирусы папилломы человека														G1 ^a	G2 ^a				
Опоясывающий герпес																			G1 ^g G2 ^g
Грипп																			S (ежегодно) ^h
COVID-19																			G1 ^h , G2 ^h , G3 ^h S (ежегодно) ^h

НОВЫЙ

НОВЫЙ

- Рекомендуемый период вакцинации
- Наверстаивающий период для первичной вакцинации еще не привитых лиц или для завершения незавершенной серии прививок

Пояснения
G Первичная вакцинация (до 3 прививок G1–G3)
A Повторная вакцинация
S Стандартная вакцинация

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

- Первая доза вакцины уже с 6-недельного возраста, в зависимости от использованной вакцины 2 или 3 дозы с интервалом не менее 4 недель.
- Недоношенные дети: дополнительная доза вакцины в возрасте 3 месяца, т. е. в общей сложности 4 дозы вакцины; Младенцы (в том числе недоношенные) вакцинируются ЛБС13 или ЛБС15.
- Согласно технической информации серия вакцинации состоит из 3 доз вакцины в возрасте от 2 до 23 месяцев и 2 доз вакцины в возрасте от 24 месяцев
- Минимальный интервал между прививками: 6 месяцев.
- Две дозы вакцины с интервалом не менее 5 месяцев, при наверстаивающей вакцинации, начиная с возраста ≥ 15 лет, или при интервале < 5 месяцев — между 1 и 2 дозами необходима третья.
- Повторная вакцина против столбняка и дифтерии (Td) каждые 10 лет. Следующая обязательная вакцинация против столбняка и дифтерии проводится однократно вакциной Tdap или, если указано, в качестве совмещенной прививки Tdap-IPV.

- Однократная вакцинация с использованием вакцины MMR для всех лиц, рожденных после 1970 года ≥ 18 лет с неизвестной историей прививок, без прививок или с одной прививкой в детском возрасте.
- Вакцинация до тех пор, пока не будет достигнуто количество ≥ 3 контактов с антигеном SARS-CoV-2, необходимое для базового иммунитета (из них как минимум 1 вакцинация). Минимальный интервал вакцинации между G1 и G2 от ≥ 4 до предпочтительно 12 недель, а между G2 и G3 ≥ 6 месяцев.
- Вакцинация PCV20
- Двукратная прививка с помощью инактивированной адьювантной вакцины от опоясывающего герпеса (герпес зостер) с интервалом от 2 до 6 месяцев максимум.
- Ежегодная вакцинация осью.
- Вакцинацию можно провести в несколько приёмов. Сделать прививку MMR и V можно за один приём либо с интервалом в 4 недели.

MAT-DE-2400751-V1-0-02/2024