


Наклейки для вашего первого фотоальбома



MAT-DE-2004554-2.0-03/2023

Информационный буклет

Вакцинация во
время
беременности



Проконсультируйтесь с врачом, чтобы
получить дополнительную информацию.




Коклюш:

Защитите своего ребенка с первого дня

Защитная вакцина во время беременности

Что такое *коклюш*?



Коклюш — очень заразное заболевание, вызывающее сильные приступы кашля, которые затрудняют дыхание. Это особенно серьезно в первые несколько месяцев жизни, поскольку младенцы в этом возрасте еще слишком малы для вакцинации и поэтому в значительной степени незащищены.

Как происходит заражение *коклюшем*?



Коклюш передается при кашле, чихании или близком контакте. Многие случаи коклюша у детей младше 6 месяцев могут быть связаны с заражением от близких членов семьи.

Болезнь с серьезными последствиями



При коклюше после длительных приступов кашля ребенок может страдать от острой нехватки воздуха, посинеть, возможна рвота. В самых тяжелых случаях коклюш может привести к пневмонии, необратимым повреждениям мозга и даже к смерти. Примерно половине больных коклюшем младенцев необходима госпитализация из-за вызванных заболеванием осложнений.

Глобальная проблема



Несмотря на наличие прививок, вспышки коклюша все еще имеют место, поскольку, например, в Германии ~50% взрослых не привиты или недостаточно привиты против коклюша. Число зарегистрированных случаев в мире также растет. За пределами Германии страны сообщают о росте числа случаев заболевания и смертности младенцев в последние годы. В таких странах, как США, Великобритания или Испания, рекомендуется прививка от коклюша во время беременности. Эта рекомендация была также сделана в Германии со стороны Ständige Impfkommission (Постоянный комитет по вакцинации, STIKO).

Как защитить ребенка от коклюша?

Вы можете защитить вашего ребенка от коклюша в первые несколько недель после рождения. Эксперты STIKO рекомендуют сделать прививку от коклюша во время каждой беременности – в идеале в 3-ем триместре или во 2-ом



триместре, если существует повышенный риск преждевременных родов. Сделав прививку, вы можете передать антитела своему будущему ребенку. Эти антитела могут защитить вашего ребенка в первые несколько недель его жизни, когда он уязвим, — до тех пор, пока он не будет вакцинирован. Вам все равно следует делать прививку во время каждой беременности, даже если вы уже были вакцинированы или сами переболели коклюшем.

Важно, чтобы не только отец, братья и сестры, но и все близкие члены семьи и другие люди, которые находятся в близком контакте с вашим ребенком, также были защищены от коклюша. Быстрая проверка у вашего семейного врача и обновления прививок, при необходимости, поможет поддерживать ваш статус вакцинации в актуальном состоянии.

