

# Calendario vaccinale (vaccinazioni standard) per lattanti, bambini, ragazzi e adulti<sup>1</sup>

Italiano



Età in	Settimane			Mesi							Anni							
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	dai 18 anni	dai 60 anni
Vaccinazione contro			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotavirus	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)														
Tetano <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2				A <sup>e</sup>	
Difterite <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2				A <sup>e</sup>	
Pertosse <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2				A3 <sup>e</sup>	
Hib <sup>b</sup> ( <i>H. influenzae</i> di tipo b)	G1		G2		G3 <sup>c</sup>													
Poliomielite <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>c</sup>								A1					
Epatite B <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>c</sup>													
Pneumococco <sup>b</sup>	G1		G2		G3 <sup>c</sup>													S <sup>g</sup>
Meningococco C							G1											
Morbillo						G1			G2									S <sup>i</sup>
Morbillo, rosolia						G1			G2									
Varicella						G1			G2									
HPV (Papilloma virus umani)													G1 <sup>d</sup> G2 <sup>d</sup>					
Herpes zoster																		G1 <sup>h</sup> G <sup>h</sup>
Influenza																		S (annuale)

■ Momento di vaccinazione consigliato □ Periodo di recupero dell'immunizzazione basilare o prima immunizzazione di tutti i soggetti non ancora vaccinati o del completamento di una serie di vaccinazioni incompleta

## Legenda

**G** Immunizzazione basilare (fino a 3 vaccinazioni parziali G1-G3)

**A** Vaccinazione di richiamo

**S** Vaccinazione standard

**a** Prima dose di vaccino già all'età di 6 settimane; in base al vaccino impiegato, 2 o 3 dosi a intervalli di almeno 4 settimane.

**b** Neonati prematuri: ulteriore dose di vaccino all'età di 3 mesi, ossia 4 dosi di vaccino complessive.

**c** Intervallo minimo dalla dose precedente: 6 mesi.

**d** Due dosi di vaccino a distanza di almeno 5 mesi; in caso di vaccinazione di recupero in età superiore ai 14 anni o

in caso di intervallo inferiore a 5 mesi, tra la 1a e la 2a dose è necessaria una 3a dose.

**e** Richiamo dell'antitetanica ogni 10 anni. Vaccinazione antitetanica successiva una tantum Tdap o, su indicazione, vaccino combinato Tdap-IPV.

**f** Vaccinazione unica con vaccino MMR per tutti i nati dopo il 1970 ≥ 18 anni con stato di vaccinazione incerto, non vaccinati o solo con vaccinazione infantile.

**g** Vaccinazione polisaccaridico 23-valente.

**h** Doppia vaccinazione con vaccino Herpes zoster inattivato adiuvato con un intervallo da minimo 2 a massimo 6 mesi.

\* Le vaccinazioni possono essere distribuite su più appuntamenti. I vaccini MMR e V possono essere somministrati lo stesso giorno o con un intervallo di 4 settimane.